

サンケイ化学 農薬登録情報

Zボルドー

登録番号：農林水産省登録 第21111号(登録会社：日本農薬(株))
有効成分：塩基性硫酸銅・・・58.0%
毒性：普通物
販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『Zボルドー』が平成23年9月7日付けで下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「だいこん」に適用病害虫名「白さび病」を追加。
- ・作物名「にんにく」に適用病害虫名「白斑葉枯病」を追加。
- ・作物名「かんきつ」「りんご」「すもも」「もも」「ネクタリン」「ぶどう」「かき」「おうとう」「うめ」「びわ」「いちじく」
「キウイフルーツ」及び「さんしょう(果実)」の使用液量「一」から「200～700L/10a」に変更。
- ・作物名「ばれいしょ」「やまのいも」「だいず」「あずき」「いんげんまめ」「さやえんどう」「実えんどう」「すいか」「トマト」「ミニトマト」「だいこん」「にんにく」「にら」「にんじん」「ごぼう」「レタス」「非結球レタス」「パセリ」「ブロッコリー」「アスパラガス」「くわい」「こんにゃく」「てんさい」「野菜類」「さんしょう(葉)」「かんしょ」「ニガウリ」及び「りんどう」の使用液量「一」から「100～300L/10a」に変更。
- ・作物名「つつじ類」及び「樹木類」の使用液量を「一」から「100～700L/10a」に変更。
- ・作物名「茶」の使用液量を「一」から「200～400L/10a」に変更。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数			
かんきつ	そうか病	400～500倍	200～700L /10a	-	-	散布	-			
	黄斑病	600倍								
	かいよう病	500～1000倍								
りんご	すす点病	500倍		-				-	散布	-
	すす班病									
すもも	黒班病			休眠期						
もも	せん孔細菌病									
ネクタリン										

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数
ぶどう	べと病 さび病 褐斑病	500～800倍	200～700L /10a	-	-	-	-
かき	落葉病	500倍					
おうとう	せん孔病						
うめ	かいよう病						
びわ	がんしゅ病	1000倍		-			
いちじく	疫病						
キウイフルーツ	花腐細菌病	500倍	休眠期～ 叢生期(新 梢長約10 cmまで)				
ばれいしょ	軟腐病	500倍	100～300L /10a	-	-	-	
	疫病	400倍					
やまのいも	葉渋病	500倍					
	炭疽病						
だいず	紫斑病						
	斑点細菌病						
あずき	褐斑細菌病						
いんげんまめ	かさ枯病						
さやえんどう	先端黄白化症	1000倍					
実えんどう							
すいか	疫病	500～800倍					
トマト	疫病	400～600倍					
	輪紋病						
ミニトマト	疫病	400～600倍					
	輪紋病						
だいこん	すすかび病	500倍					
	黒斑細菌病						
にんにく	白さび病						
	春腐病						
	さび病						
にら	白斑葉枯病						
にら	株腐細菌病						
にんじん	黒葉枯病	500～800倍					
ごぼう	黒斑細菌病	500倍					
レタス 非結球レタス	腐敗病	500～800倍					
パセリ	軟腐病	800倍					
ブロッコリー	花蕾腐敗病	500倍					
アスパラガス	斑点病						
	茎枯病						
アスパラガス	葉枯病	8倍	8L/10a	無人ヘリコプ ターによる散布			
	くわい	ひぶくれ病	500倍	100～300L /10a	-	-	-
こんにゃく	葉枯病	500～800倍					
茶	腐敗病		400倍				
	炭疽病						
	赤焼病	500倍	200～400L /10a	摘採7日 前まで	-	-	
	もち病	400～500倍					
茶	網もち病	400～500倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数
てんさい	褐斑病	400倍	100~300L /10a	-	-	散布	-
野菜類	斑点細菌病 褐斑細菌病 黒腐病 べと病	500倍					
さんしょう(果実)	さび病	1000倍	200~700L /10a				
さんしょう(葉)							
かんしょ	斑点病	500倍	100~300L /10a				
にがうり	うどんこ病						
りんどう	葉枯病						
つつじ類	もち病						
樹木類	斑点症(シュートサクスポラ菌)	800倍	100~700L /10a	発病初期			
	輪紋葉枯病	500倍					

<注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951