

サンケイ化学 農薬登録情報

スタウトダントツ箱粒剤

クロチアニジン・イソチアニル粒剤

登録番号：農林水産省登録第 22698 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：クロチアニジン・・・1.5%

イソチアニル・・・2.0%

毒性：普通物（毒物・劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「スタウトダントツ箱粒剤」は平成 31 年 2 月 27 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「稲」を追加する。
- ・作物名「稲（育苗箱）」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「4回以内（移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内）」を「4回以内（移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）」に変更する。
- ・作物名「湛水直播水稻」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「4回以内（は種までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内）」を「4回以内（は種までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ記載）】

次ページに記す

【使用上の注意事項】

- ・「側条処理する場合は、粒剤が均一に散布できる施用装置を装着した田植機を使用すること。」を追加する。
なお、使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照して下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クチアジンを含む農薬の総使用回数	イチアールを含む農薬の総使用回数
稲(育苗箱)	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病	育苗箱 (30×30×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の床土 または 覆土に均一に 混和する。	4回以内 (移植時までの 処理は1回以 内、本田での散 布、空中散布、 無人航空機散布 は合計3回以 内)	3回以内 (移植時までの 処理は1回以 内、本田では 2回以内)
	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタオビコウアガ ニカメイチュウ イネヒメハモグリバエ		は種時 (覆土前) ～ 移植当日		育苗箱の上 から均一に 散布する。		
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病		は種時 (覆土前)				
稲	いもち病 イネミズゾウムシ	1kg/10a	移植時		側条処理	4回以内 (直播での種時 または移植時ま での処理は1回 以内、本田での 散布、空中散布 、無人航空機散 布は合計3回以 内)	3回以内 (直播での種時 または移植時ま での処理は1回 以内、本田では 2回以内)
湛水直播水稻	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	1kg/10a	は種時		は種同時施薬機 を用いて土中施 用する。	4回以内 (は種までの処 理は1回以内、 本田での散布、 空中散布、無人 航空機散布は合 計3回以内)	3回以内 (は種時までの 処理は1回以 内、本田では2 回以内)