

サンケイ化学 農薬登録情報

Zボルドー

銅水和剤

登録番号：農林水産省登録第 24041 号（登録会社：日本農薬株式会社）

有効成分：塩基性硫酸銅・・・58.0%（銅として 32.0%）

毒性：普通物（毒物・劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「Zボルドー」は平成 31 年 3 月 13 日付を以て下記の内容で適用変更いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「なす」の適用病害虫名「すすかび病」、「きゅうり」の適用病害虫名「べと病」の使用量「588g/10a」、使用液量「10L/10a」、使用方法に「常温煙霧」を追加する。
- ・作物名「アスパラガス」の使用方法「無人ヘリコプターによる散布」を「無人航空機による散布」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大部分のみ記載）】

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数
なす	温室、ガラス室、ビニールハウス等 密閉できる場所	すすかび病	588g/10a	10L/10a	-	-	常温煙霧	-
きゅうり		べと病						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数
アスパラガス	斑点病 茎枯病	500倍	100～ 300L/10a	-	-	散布	-
	茎枯病	8倍	8L/10a			無人航空機による散布	

【注意事項の変更等について】

【追加】

- ・ハウス等の常温煙霧用として使用する場合は特に次の事項に注意すること。
 - ①専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧すること。特に常温煙霧装置の選定及び使用にあたっては、病虫害防除所等関係機関の指導を受けること。
 - ②作業はできるだけ夕刻に行い、作業終了後6時間以上密封しておくこと。できれば翌朝までそのままとし、開放後十分換気して入室すること。
 - ③煙霧が直接植物体に当たると葉や果実に汚れを生じるので、果実に煙霧が直接当たらないよう措置をとること。
- ・常温煙霧中はハウス内に入らないこと。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室すること。

【変更後】（変更箇所のみ）

- ・アスパラガスの無人航空機による使用の場合、連用散布すると薬害を生じるおそれがあるので3回以上の散布はさけること。
- ・無人航空機による使用の場合、散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に被害を被害を及ぼすおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
- ・無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないように特に注意すること。



サンケイ化学株式会社

本

社 〒 8 9 1 - 0 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL : (0 9 9) 2