

サンケイ化学 農薬登録情報

バイオネクト

脂肪酸グリセリド・有機銅水和剤

登録番号：農林水産省登録第21020号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：脂肪酸グリセリド・・・・・・・・・・55.0%

8-ヒドロキシキノリン銅・・・・30.0%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「バイオネクト」は平成31年4月10日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「ぶどう」の有機銅を含む農薬の総使用回数「4回以内（開花後は1回以内）」を「7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内（但し、開花後は1回以内）」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 脂肪酸グリセリドを含む農薬の総使用回数 | 有機銅を含む農薬の総使用回数 |
|-----|--------------------|------------|------------------|----------|------------------------|------|---------------------|--|
| ぶどう | 黒とう病 枝膨病 晩腐病 | 250～500倍 | 200～ 700L/10a | 休眠期～開花前 | 4回以内 (開花後は 1回以内) | 散布 | — | 7回以内 (塗布は3回以 内、散布は4回 以内(但し、開 花後は1回以 内)) |
| | つる割病 | 250倍 | | 収穫45日前まで | | | | |
| | べと病 | 1000～2000倍 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【使用上の注意事項】

当該適用拡大に伴う注意事項の変更等はありません。なお、使用の際は製品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

| | | | |
|---------|-----------|------------------------------|-------------------|
| 本社 | 〒891-0122 | 鹿児島市南栄二丁目9 | TEL:(099)268-7588 |
| 東京本社 | 〒110-0005 | 東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F | TEL:(03)3845-7951 |
| 大阪営業所 | 〒532-0011 | 大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F | TEL:(06)6305-5871 |
| 東京営業部 | 〒366-0032 | 埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1 | TEL:(048)551-2122 |
| 九州北部営業所 | 〒841-0025 | 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 | TEL:(0942)81-3808 |
| 宮崎事務所 | 〒880-0056 | 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル | TEL:(0985)25-7051 |