

# サンケイ化学 農薬登録情報

## サンケイクレマートU粒剤

ブタミホス粒剤

登録番号：農林水産省登録第 14654 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：ブタミホス・・・3.0%

毒性：普通物（毒物・劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：全国

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「サンケイクレマートU粒剤」は令和元年 6 月 12 日付を以て下記の内容で適用変更いたしました。

#### 【適用雑草の範囲または使用方法変更の内容】

- ・適用土壌及び適用地帯を削除する。
- ・作物名「漬物用すいか」を追加する。
- ・作物名「たまねぎ」を追加し、作物名「たまねぎ（春播栽培）」及び「たまねぎ（秋播栽培）」を削除する。
- ・作物名「くわい」及び「せり」の適用雑草名「水田一年生雑草」を「一年生雑草」に変更する。

#### 【適用雑草名および使用方法】

次ページに記載する。

#### 【注意事項の変更等について】

当該登録拡大に伴う注意事項等の変更はありません。

なお、使用の際は商品に貼付してあるラベルをご参照ください。



## サンケイ化学株式会社

本社	〒 8 9 1 - 0 鹿児島市南栄二丁目9	TEL : ( 0 9 9 ) 2 6
東京本社	〒 1 1 0 - 0 東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL : ( 0 3 ) 3 8 4
大阪営業所	〒 5 3 2 - 0 大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F	TEL : ( 0 6 ) 6 3 0
東京営業部	〒 3 6 6 - 0 埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL : ( 0 4 8 ) 5 5 1 - 2 1 2 2
九州北部営業所	〒 8 4 1 - 0 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL : ( 0 9 4 2 ) 8
宮崎事務所	〒 8 8 0 - 0 宮崎県神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL : ( 0 9 8 5 ) 2

【適用雑草名および使用方法】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ブタホスを含む農薬の総使用回数		
たまねぎ	一年生雑草	春播栽培の定植後 (雑草発生前) 但し収穫の60日前まで	5~7kg /10a	1回	全面土壌散布	1回		
すいか		秋播栽培の定植後又は 春季の雑草発生前 但し収穫の60日前まで						
漬物用すいか		定植・マルチ前 (雑草発生前)						
メロン 漬物用メロン		定植前~定植直後 (雑草発生前)	4~6kg /10a					
キャベツ		定植活着後 (雑草発生前) 但し定植10日後まで			畦間株間 土壌散布			
トマト		植付後萌芽前 (雑草発生前)	5~6kg /10a		全面土壌散布			
ねぎ わけぎ あさつき		は種後発芽前 (雑草発生前)						
やまのいも さといも にんにく		一年生広葉雑草						
ばれいしょ								
らっかせい にんじん パセリ								
こんにゃく		一年生雑草	植付後又は培土後 (雑草発生前) 但し収穫120日前まで		4~6kg /10a		1回	全面土壌散布
かんしょ	挿苗後(雑草発生前) 挿苗3日後まで							
にら	定植後(雑草発生前) 但し定植10日後まで							
きゅうり	定植前(雑草発生前) 定植後(雑草発生前) 但し定植10日後まで		畦間株間 土壌散布					
くわい	一年生雑草	植付後出芽前 (雑草発生前)	5kg/10a	1回	湛水散布	1回		
せり		親株養成期 (雑草発生前)	3~5kg /10a					
やまのいも(むかご)	一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草発生前)	4kg/10a	3回以内	全面土壌散布	3回以内		
きく		定植後(雑草発生前)	4~6kg /10a					
つつじ類 さざんか		植付後又は生育期 (雑草発生前)						
桑		春季桑発芽前および 夏季収穫後発芽前 (雑草発生前)	8~10kg /10a				2回以内	2回以内
たばこ (折衷マルチ栽培)		植付10日前まで (雑草発生前)	4kg/10a				1回	1回