

# サンケイ化学 農薬登録情報

## トラサイドA乳剤

マラソン・MEP 乳剤

登録番号：農林水産省登録第 14166 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：マラソン・・・10.0%

MEP・・・40.0%

毒性：普通物（毒物、劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：全国

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「トラサイドA乳剤」は令和元年6月27日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「みかん」「りんご」「なし」「おうとう」「くり」および「かき」の使用方法「樹幹部に十分散布」の使用液量を「0.5～2.0L/樹」とする。使用方法「樹幹及び主枝に十分散布する。」の使用液量を「100～450L/10a」とする。
- ・作物名「かき」の使用時期を「産卵期～幼虫食入初期 但し収穫30日前まで」に変更する。

#### 【適用病害虫名および使用方法】

次ページに記載する。

#### 【注意事項の変更について】

当該適用拡大に伴う注意事項の変更等はありません。

なお、使用の際は商品に貼付されているラベルを参照してください。



## サンケイ化学株式会社

本社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588
東京本社	〒110-0005	東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL:(03)3845-7951
大阪営業所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F	TEL:(06)6305-5871
東京営業部	〒366-0032	埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL:(048)551-2122
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL:(0942)81-3808
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラソンを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数
ぶどう	ブドウトラカミキリ	200～300倍	200～700L/10a	発芽前(休眠期)	2回以内	散布	6回以内	4回以内 (収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内)
みかん	カミキリムシ類	200倍	0.5～2.0L/樹	産卵最盛期～幼虫食入初期但し収穫14日前まで	1回	樹幹部に十分散布	5回以内	5回以内 (樹幹処理は1回以内)
もも	コスカシバ	200～300倍	100～450L/10a	収穫後～発芽前(幼虫食入期)	1回	樹幹及び主枝に十分散布する。	5回以内	6回以内 (樹幹処理は1回以内)
ネクタリン			100～450L/10a					
ずもも		200倍	100～450L/10a		2回以内		2回以内	2回以内
りんご	カミキリムシ類	200倍	0.5～2.0L/樹	産卵初期～産卵最盛期直前 但し収穫30日前まで	3回以内	樹幹部に十分散布	5回以内 (休眠期から芽出直後までは1回以内)	3回以内
	クワイムシ類			4～7月但し収穫30日前まで				
	リンゴアナアキゾウムシ			7～8月(幼虫食入期)但し収穫30日前まで				
			3L/樹	地際部灌注				
なし	カミキリムシ類	200倍	0.5～2.0L/樹	6～7月(産卵初期～産卵最盛期直前)但し収穫21日前まで	5回以内	樹幹部に十分散布	5回以内 (休眠期は1回以内)	6回以内
	クワイムシ類			4～7月但し収穫21日前まで				
おうとう	リンゴアナアキゾウムシ	200倍	0.5～2.0L/樹	7～8月(幼虫食入期)	1回	樹幹部に十分散布	5回以内 (休眠期の50倍希釈散布は1回以内)	2回以内 (樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内)
			3L/樹			地際部灌注		
			コスカシバ	100～450L/10a		収穫後～萌芽前(幼虫食入期)		
くり	カミキリムシ類	100～200倍	0.5～2.0L/樹	裂果前 但し収穫14日前まで	1回	樹幹部に十分散布	4回以内	4回以内 (樹幹処理は1回以内)
	クリタマバチ	200～700L/10a		発芽直前	1回	散布		
かき	ヒメコスカシバ	200倍	0.5～2.0L/樹	産卵期～幼虫食入初期但し収穫30日前まで	2回以内	樹幹部に十分散布		3回以内 (樹幹処理は2回以内)
桑	カミキリムシ類	100～200倍	100～300L/10a	発芽前(3～4月)及び夏切直後	6回以内	散布	6回以内	6回以内
		100倍		晩秋期				