

サンケイ化学 農薬登録情報

スタークル液剤 10

ジノテフラン液剤

登録番号：農林水産省登録第 21259 号（登録会社：三井化学アグロ株式会社）

有効成分：ジノテフラン・・・10.0%（IRACコード：**4A**）

毒性：普通物（毒物、劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「スタークル液剤 10」は令和元年 11 月 6 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「らっきょう」を追加する。
- ・作物名「だいず」及び「えだまめ」の適用病害虫名に「ダイズサヤタマバエ」を追加する。
- ・作物名「えだまめ」の使用方法「空中散布」「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「さとうきび」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
だいず	フタスジヒメハムシ	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
	カメムシ類	8倍	0.8L/10a			無人航空機による散布	
	ダイズサヤタマバエ					空中散布	
えだまめ	フタスジヒメハムシ	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	2回以内
	カメムシ類	8倍	0.8L/10a			無人航空機による散布	
	ダイズサヤタマバエ					空中散布	
らっきょう	アザミウマ類 ハモグリバエ類	8倍	1.6L/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
さとうきび	カンシャコバネナガカメムシ イナゴ類	1000倍	100～300L/10a	収穫45日前まで	3回以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)

【使用上の注意事項等の変更について】

なし。なお、使用の際は製品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル TEL:(0985)25-7051