

# サンケイ化学 農薬登録情報

## スタークル粒剤

ジノテフラン粒剤

登録番号：農林水産省登録第 20805 号（登録会社：三井化学アグロ株式会社）

有効成分：ジノテフラン・・・1.0%（IRACコード：**4A**）

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：九州全県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「スタークル粒剤」は令和元年 11 月 20 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「稲」の適用病害虫名に「イネミズゾウムシ」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」の適用病害虫名に「クロバネキノコバエ類」を追加する。
- ・作物名「さとうきび」の適用病害虫名に「メイチュウ類」を追加する。
- ・作物名「なし（苗木）」を追加する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

#### 【使用上の注意事項の変更等について】

下記の太字部分を追加する。

- ・かんきつ**及びなし**に用いる場合は、今期に収穫見込みのない苗木に対して株元散布し、処理後は軽く散水すること。なお、本剤を散布してから効果を発揮するまでにある程度の期間を要するため、対象害虫の発生前に予防的に散布すること。
- ・なお、使用の際は商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



## サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0 鹿児島市南栄二丁目9

TEL:(099)268-7588

九州北部営業所 〒841-0 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3

TEL:(0942)81-3808

宮崎事務所 〒880-0 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメトランを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ カメムシ類 イネドロオイムシ	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 （育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）
	イネミズゾウムシ					
ねぎ	アザミウマ類	6kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	4回以内 （は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内）
	ハモグリバエ類		定植時		株元散布	
	アザミウマ類		生育期 但し、収穫3日前まで	2回以内		
	クロバネキノコバエ類	6～9kg/10a				
さとうきび	カンシャコバネナガカメムシ	6～9kg/10a	生育期 但し、収穫45日前まで	2回以内	散布	5回以内 （粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内）
	メイチュウ類	9kg/10a				
なし (苗木)	アブラムシ類	20g/株 (但し、10a当り110kgまで)	育苗期	1回	株元散布	1回