

サンケイ化学 農薬登録情報

パダン粒剤4

カルタップ粒剤

登録番号：農林水産省登録第 11188 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：カルタップ塩酸塩・・・4.0% IRACコード：**14**

毒性：劇物

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「パダン粒剤4」は令和2年1月29日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「稲」の使用方法「手、又は散粒機で田面に均一に散粒する。」を「散布」に変更する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」におけるカルタップを含む農薬の総使用回数「6回以内（種もみ浸漬は1回以内、床土への混和、育苗箱への処理及び側条処理は合計1回以内）」を「6回以内（浸種前は1回以内、浸種後から移植時までの処理は1回以内）」に変更する。
- ・作物名「稲」におけるカルタップを含む農薬の総使用回数「6回以内（種もみ浸漬は1回以内、床土への混和、育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内）」を「6回以内（浸種前は1回以内、浸種後から直播での種時又は移植時までの処理は1回以内）」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法【今回の適用拡大に該当する作物のみ記載】】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カルタップを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネドロオウムシ イネハモグリバエ ツマグロヨコバイ コブノメイガ	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り 50~100g	は種前又は 移植当日	1回	は種前に育苗箱床土に均一に混和するか、又は移植当日に育苗箱中の苗の上から均一に散粒する。	6回以内 (浸種前は1回以内、浸種後から移植時までの処理は1回以内)
	イネミズゾウムシ スクミリンゴガイ (食害防止)	育苗箱1箱当り 60~100g				
	ニカメイチュウ イネゾウムシ幼虫	育苗箱1箱当り 80~100g				
稲	ニカメイチュウ イネツトムシ コブノメイガ フタオビコヤガ アザミウマ類	3~4kg/10a	収穫30日前 まで	6回以内	散布	6回以内 (浸種前は1回以内、浸種後から直播での種時又は移植時までの処理は1回以内)
	サンカメイチュウ第3世代 スクミリンゴガイ (食害防止)	4kg/10a				

【注意事項の変更等について】

当該適用拡大に伴う注意事項の変更等はありません。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照して下さい。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051