

# サンケイ化学 農薬登録情報

## サンケイアディオン乳剤

ペルメトリン乳剤

登録番号：農林水産省登録第 15960 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：ペルメトリン・・・20.0% （RAC J-D：3A）

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：九州全県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「サンケイアディオン乳剤」は令和 2 年 6 月 18 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「非結球あぶらな科葉菜類（しろな、みずな、なばな類を除く）」を追加する。
- ・作物名「しろな」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収穫前日まで」に変更し、本剤の使用回数及びペルメトリンを含む農薬の総使用回数を「2 回以内」から「3 回以内」に変更する。
- ・作物名「みずな」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収穫前日まで」に変更し、本剤の使用回数及びペルメトリンを含む農薬の総使用回数を「1 回」から「3 回以内」に変更する。
- ・作物名「みずな」に適用病害虫名「アオムシ」、希釈倍数「2000 倍」を追加する。
- ・作物名「ほうれんそう」の使用時期を「収穫 21 日前まで」から「収穫 14 日前まで」に変更する。
- ・作物名「かぶ」を追加する。
- ・作物名「非結球レタス（リーフレタスを除く）」を追加する。
- ・作物名「リーフレタス」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収穫 3 日前まで」に変更する。
- ・作物名「レタス」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収穫 3 日前まで」に変更する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記す。

#### 【使用上の注意事項の変更等】

- ・当該適用拡大に伴う注意事項等の変更はありません。

なお、使用の際は製品に貼付されているラベルを参照して下さい。



## サンケイ化学株式会社

本社  
九州北部営業所  
宮崎事務所

〒891-0122  
〒841-0025  
〒880-0056

鹿児島市南栄二丁目9  
佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3  
宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(099)268-7588  
TEL:(0942)81-3808  
TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペルメリンを含む農薬の総使用回数
非結球あぶらな科 葉菜類(しろな、 みずな、なばな類 を除く)	アオムシ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
しろな	アオムシ	2000～4000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
みずな	アブラムシ類 ダイコンハムシ ヤサイゾウムシ	3000倍					
	アオムシ	2000倍					
ほうれんそう	アブラムシ類 ハクサイダニ	3000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
かぶ	アオムシ	2000倍		収穫前日まで			4回以内 (散布は2回以内)
非結球レタス (リーフレタスを除く)	アブラムシ類			収穫3日前まで			2回以内
リーフレタス レタス	アブラムシ類 ヨトウムシ	2000～3000倍		収穫3日前まで			5回以内