

サンケイ化学 農薬登録情報

ベストガード水溶剤

ニテンピラム水溶剤

登録番号：農林水産省登録第 19102 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ニテンピラム・・・10.0% IRACコード：4A

毒性：普通物（毒物、劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「ベストガード水溶剤」は令和2年7月8日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「かんしょ」の適用病害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」、「トマト」、「ミニトマト」および「きゅうり」の適用病害虫名「クロバネキノコバエ類」の希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に変更する。
- ・作物名「なす」の適用病害虫名「カメムシ類」の希釈倍数「1000倍」を「1000～2000倍」に変更する。
- ・作物名「花き類・観葉植物（ポインセチア、きく、ばら、ゆりを除く）」、「ポインセチア」および「ばら」の適用病害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に変更する。
- ・作物名「ゆり」を作物名「花き類・観葉植物」に統合し、削除する。
- ・作物名「花き類・観葉植物（ポインセチア、きく、ばら、ゆりを除く）」を「花き類・観葉植物（ばら、きくを除く）」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【注意事項の変更について】

当該適用拡大に伴う注意事項の変更等はありません。

なお、使用の際の注意事項については商品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ニテンピラムを含む農薬の総使用回数
かんしょ	-	コナジラミ類	1000倍	100～300g /10a	育苗期	3回以内	散布	3回以内
		アブラムシ類	1000～2000倍					
ねぎ		ネギアザミウマ	1000～2000倍		収穫前日まで			4回以内 (定植時までの処理は1回以内、株元処理及び水溶剤の散布は合計3回以内)
		ネギハモグリバエ	1000～2000倍					
トマト ミニトマト		アブラムシ類	1000～2000倍		収穫前日まで			4回以内 (定植時までの処理は1回以内、水溶剤の散布は3回以内)
		コナジラミ類 アザミウマ類						
きゅうり		クロバネキノコバエ類	1000～2000倍		発生初期			4回以内
		コナジラミ類 アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ	1000～2000倍					
なす		クロバネキノコバエ類	1000～2000倍		発生初期			4回以内
		コナジラミ類 アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ	1000～2000倍					
花き類・観葉植物 (ばら、きくを除く)		カメムシ類	1000～2000倍		発生初期			4回以内
		コナジラミ類	1000倍					
ポインセチア		アブラムシ類	1000～2000倍		発生初期			4回以内
		アブラムシ類	1000～2000倍					
ばら	コナジラミ類 チビクロバネキノコバエ	1000倍	発生初期	4回以内				
	コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ	1000倍						
	アブラムシ類	1000～2000倍						