

# サンケイ化学 農薬登録情報

## スタークル粒剤

### ジノテフラン粒剤

登録番号：農林水産省登録第 20805 号（登録会社：三井化学アグロ株式会社）

有効成分：ジノテフラン・・・1.0%（IRACコード：**4A**）

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：九州全県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「スタークル粒剤」は令和 2 年 12 月 9 日付で記の内容を適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「いぐさ」を追加する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
いぐさ	イグサシムシガ	3～6kg/10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内

#### 【使用上の注意事項の変更等について】

##### 【変更前】

- 水稲に使用する場合には、湛水状態（3cm 程度）で田面に均一に散布し、4～5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水やかけ流しをしないこと。

##### 【追加】

- 本剤をくわいに使用する場合には、田面に均一に散布し散布後4～5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水やかけ流しをしないこと。

##### 【変更後】

- 本剤を水稲及びいぐさに使用する場合には、湛水状態（3cm 程度）で田面に均一に散布し、4～5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水やかけ流しをしないこと。
- 本剤をくわいに使用する場合には、田面に均一に散布し散布後4～5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水やかけ流しをしないこと。
- つまみ菜・間引き菜には使用しないこと。
- 本剤の株元散布を行う際は、処理直後に灌水すること。
- かんきつ及びなしに用いる場合は、今期に収穫見込のない苗木に対して株元散布し、処理後は軽く散水

すること。なお、本剤を散布してから効果を発揮するまでにある程度の期間を要するため、対象害虫の発生前に予防的に散布すること。

- (6) ふきに使用する場合には、葉に付着した薬剤は払い落とすこと。
- (7) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (8) ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
  - ① ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
  - ② 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- (9) 容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- (10) 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。  
とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

なお、使用に当っては商品に貼付してあるラベルを参照ください。



本 社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL:(0942)81-3808
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL:(0985)25-7051