

サンケイ化学 農薬登録情報

スタウトダントツ箱粒剤

クロチアニジン・イソチアニル粒剤

登録番号：農林水産省登録第 22698 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：クロチアニジン・・・1.5% IRACコード：4A

イソチアニル・・・2.0% FRACコード：P3

毒性：普通物（毒物・劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「スタウトダントツ箱粒剤」は令和3年10月27日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「稲（箱育苗）」の使用方法「育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。」および「育苗箱の上から均一に散布する。」に使用量「高密度には種する場合は 1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5ℓ）1箱当り 50～100g）」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記す。

【使用上の注意事項】

○追加事項

- ・育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5ℓ）1箱当りに乾粉として 200 から 300g 程度を高密度には種する場合は、10a 当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が 1kg/10a までとなるよう、育苗箱 1箱当りの薬量を 50 から 100g までの範囲で調整すること。
- ・なお、ご使用の際は商品に貼付してあるラベルをご参照ください。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	イソアールを含む農薬の総使用回数	
稲 (箱育苗)	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病 いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ ニカメイチュウ イネヒメハモグリバエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50g	高密度に は種する 場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り 50～100g)	は種前	1回	育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。	4回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ ニカメイチュウ イネヒメハモグリバエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50g	高密度に は種する 場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り 50～100g)	は種時 (覆土前) ～ 移植当日		育苗箱の上から均一に散布する。		
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50g	高密度に は種する 場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り 50～100g)	は種時 (覆土前)				



サンケイ化学株式会社