

サンケイ化学 農薬登録情報

スタークル顆粒水溶剤

ジノテフラン水溶剤

登録番号：農林水産省登録第 20811 号（登録会社：三井化学アグロ株式会社）

有効成分：ジノテフラン・・・・・・・・・・20.0% IRACコード：**4A**

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「スタークル顆粒水溶剤」は令和3年12月22日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・ 作物名「だいこん」の適用病害虫名に「ダイコンハムシ」を追加する。
- ・ 作物名「はくさい」の適用病害虫名に「ダイコンハムシ」を追加する。
- ・ 作物名「オクラ」の適用病害虫名に「フタテンミドリヒメヨコバイ」を追加する。
- ・ 作物名「豆類（未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟ささげを除く）」を「豆類（未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟ささげ、未成熟そらまめを除く）」と「未成熟そらまめ」に分離し、作物名「未成熟そらまめ」の適用病害虫名に「カメムシ類」を追加する。
- ・ 作物名「えだまめ」のジノテフランを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「3回以内（は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「さとうきび」の使用時期を「収穫7日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「だいず」のジノテフランを含む農薬の総使用回数「3回以内（は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内）」を「3回以内（は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「だいこん」のジノテフランを含む農薬の総使用回数「5回以内（は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計2回以内）」を「5回以内（は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「キャベツ」のジノテフランを含む農薬の総使用回数「3回以内（育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内）」を「3回以内（育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「ブロッコリー」のジノテフランを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内）」を「3回以内（定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「ねぎ」のジノテフランを含む農薬の総使用回数「4回以内（は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内）」を「4回以内（は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「なばな類」を削除する。
- ・ 作物名「非結球あぶらな科葉菜類（チンゲンサイを除く）」を「非結球あぶらな科葉菜類（チンゲンサイ、畑わさびを除く）」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジネフランを含む農薬の総使用回数
だいこん	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	5回以内 (は種時の播種土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
	ダイコンハムシ	2000倍					
	クスジノミハムシ	1000倍					
はくさい	アブラムシ類	2000～3000倍		収穫3日前まで			3回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
	クスジノミハムシ	2000倍					
	ダイコンハムシ						
豆類 (未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟ささげ、未成熟そらまめを除く)	アブラムシ類 ハモグリバエ類	2000倍		収穫7日前まで			2回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
えだまめ	カメムシ類 ダイズサヤタマバエ アブラムシ類 ハモグリバエ類	3000倍					
	フタスジヒメハムシ						
未成熟そらまめ	アブラムシ類 ハモグリバエ類 カメムシ類	2000倍		収穫前日まで			3回以内 (株元散布は1回以内、散布は2回以内)
オクラ	アブラムシ類 フタテンミドリヒメヨコバイ						
さとうきび	アブラムシ類 カンシャコバナネナガカメムシ サトウキビチビアザミウマ		3000倍	収穫7日前まで	3回以内 5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)		
だいず	カメムシ類 ダイズサヤタマバエ	3000倍		収穫7日前まで	2回以内 3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計2回以内)		
	フタスジヒメハムシ						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノフランを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	50～100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3ℓ)当り0.5ℓ	定植前日～定植時	1回	灌注	
ブロッコリー	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内 (育苗期の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
	アブラムシ類 コナガ	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5～4ℓ)当り0.5ℓ	定植時	1回	灌注	
ねぎ	アザミウマ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	4回以内 (は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布は合計2回以内)
	アザミウマ類 ハモグリバエ類 シロイチモジヨトウ タネバエ ネギコガ	50倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5～4ℓ)当り0.5ℓ	定植前日～定植時	1回	灌注	
	クロバネキノコバエ類	1000倍	1ℓ/㎡	生育期 但し、 収穫14日前 まで		株元灌注	
	アザミウマ類	400倍	0.4ℓ/㎡				
	ハモグリバエ類 トビイロヒョウタンゾウムシ						
	非結球あぶらな科 葉菜類(チンゲンサイ、畑わさびを除く)	アブラムシ類	3000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	
キスジノミハムシ		2000倍					

【注意事項の変更等について】

- ・当該適用拡大に伴う使用上の注意事項の変更等はありません。
- ・なお、使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL:(099)268-7588
 宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル TEL:(0985)25-7051