

殺菌剤

ビオネクスト®

脂肪酸グリセリド・有機銅水和剤



水溶性内袋で使いやすい!
汚れの少ない殺菌剤!



サンケイ化学株式会社

ピオネクト[®]

農林水産省登録 第21020号
有効成分：脂肪酸グリセリド 55.0%
8-ヒドロキシキノリン銅 30.0%
性状：暗黄緑色水和性粘稠懸濁液体
性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
毒包：100ml水溶性内袋×60
500ml水溶性内袋×20



- 植物由来の脂肪酸グリセリドの作用による汚れの少ない製剤です。
- 水溶性袋を用いた製剤でタンクに入れるだけなので、薬剤の調製が簡単です。
- 脂肪酸グリセリドの作用で作物への付着性が良いため、展着剤を入れずにご使用できます。

適用病害虫名および使用方法

平成24年11月7日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	脂肪酸グリセリドを含む 農薬の総使用回数	有機銅を含む 農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 褐斑病、炭疽病 輪紋病、黒星病 すす点病 すす斑病	1000倍	200～700L	収穫 14 日前まで	4 回以内	散布	—	7 回以内 (塗布は 3 回以内、 散布は 4 回以内)
	かき							炭疽病、落葉病 うどんこ病 すす点病
ぶどう	黒とう病 枝膨病、晩腐病	250～500倍		休眠期～開花前	4 回以内 (開花後は 1 回以内)			4 回以内 (開花後は 1 回以内)
	べと病	1000～ 2000倍		収穫 45 日前まで				
もも	縮葉病	500倍	発芽期～ 開花直前まで 但し、 収穫 60 日前まで	5 回以内	8 回以内 (塗布は 3 回以内、 散布は 5 回以内)			
いちご	炭疽病	600倍	100～300L	育苗期	3 回以内	3 回以内		

▲ 使用上の注意事項

- りんごに使用する場合は落花直後から、落花20日頃までの散布は、サビ果の発生を多くする場合がありますので避けてください。
- りんごは樹勢の弱い場合に連用散布すると生理落葉を助長する事例もあるので通年連用は避け、3～4回にとどめることをおすすめします。特にゴールデン種では注意してください。
- ぶどうの生育期に使用する場合、果実肥大期（あずき粒大）以降の散布はサビ果や果房の汚れを生ずるおそれがあるので無袋栽培ではこの時期以降の散布は避けてください。
- 水和硫黄などの混用は薬害の恐れがあるので避けてください。
- 発芽、展葉後は石灰硫黄合剤との混用は薬害の恐れがあるので避けてください。
- 水溶性フィルム包装剤については下記の注意事項を守ってください。
 - 内袋はぬれた手で触れないでください。
 - 内袋はそのまま所定量の水に投入してください。
 - 外装の開封後は使い切ることをおすすめします。
 - 水溶性フィルム包装剤は通常の取り扱いでは問題ありませんが、強い衝撃を与えたり、鋭利な物で突かないでください。
 - 万一外装内で内袋が破袋した場合は、全量を所定量の水に投入すれば問題ありません。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。
- 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用は避けてください。
- 水産動植物（甲殻類、藻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用して下さい。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 水溶性内袋の使用方法

① 散布液調製タンクまたは調製容器に水を3分の1程度ためます。

② 外袋の上部を切り口から手などで切り取ります。

③ 外袋の底部をもちながら内袋をタンク内に投入します。
※内袋になるべく触らず投入したほうがよい。

④ よくかくはんしながらタンクまたは容器に水を満たして下さい。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所に置かないでください。

NIK-BNK2014.7S

取扱い



サンケイ化学株式会社

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野 7-6-11 ☎(03) 3845-7951
 東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目 13-1 ☎(048) 551-2122
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4丁目 5-1 ☎(06) 6305-5871