

果樹の害虫防除に!!

新規ネオニコチノイド殺虫剤

適用拡大

# ダントツ<sup>®</sup> 水溶剤



等の主要害虫を  
幅広く防除!



容量: 125g  
250g

これ1本(125g)で  
500ℓ分  
(4000倍)



ブルーベリーに  
適用拡大



ユキヤナギアブラムシ チャノキイロアザミウマ チャバネアオカメムシ キンモンホソガ フジコナカイガラムシ モモシクイガ オウトウショウジョウバエ カキノヘタムシガ

りんご・もも・ぶどう・なし・うめ・かんきつ・かき・おうとう等の害虫防除に!!



有効成分：クロチアニジン…16.0%  
人畜毒性：普通物  
魚毒性：A類(原体)

## 特長

- ①アブラムシ、コナカイガラムシ、アザミウマ、ヨコバイなどの吸汁性害虫からシンクイムシ、ホソガ、ハモグリガ、カミキリなど、果樹の主要害虫を幅広く防除することができます。
- ②シンクイムシ類に対して殺卵効果と幼虫の食入防止効果があります。
- ③カメムシ類に対して速効的な殺虫力と吸汁抑制効果が期待できます。
- ④既存薬剤に抵抗性の発達したアブラムシ類に対しても高い効果を示します。
- ⑤りんご・ぶどう・なし・おうとうは収穫前日まで、うめ・ネクタリン・あんず・すもも・いちじく・パパイアは収穫3日前まで使えます。
- ⑥2000～4000倍で効果が長期間持続するので経済的です。
- ⑦粉立ちが少なく溶けやすい顆粒水溶剤です。

### ⚠ 使用上の注意事項

- ぶどうに使用する場合、袋かけ前までの幼果期に散布すると品種によっては果粉が溶脱するおそれがあるので注意してください。
- かんきつに樹幹散布で使用する場合は、樹幹部から地際部に十分量を散布または塗布してください。また、散布液が葉にかかると葉害を生ずるおそれがあるので、葉にかからないように十分に注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
  - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
  - ③養蜂が行なわれている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。

## 適用害虫と使用方法

ダントツ水溶剤は野菜・茶・水稻の害虫にも登録があります。

| 作物名    | 適用害虫名   | 希釈倍数(倍)                                | 使用液量             | 使用時期               | 本剤の使用回数 | 使用方法 |                |               |      |    |
|--------|---|--|------------------|--------------------|---------|------|----------------|---------------|------|----|
| りんご    | カメムシ類<br>キンモンホソガ<br>ギンモンハモグリガ<br>シンクイムシ類<br>アブラムシ類<br>コナカイガラムシ類<br>リンゴワタムシ<br>ケムシ類  | 2000～4000                              | 200～700<br>ℓ/10a | 収穫前日まで             | 3回以内    | 散布   |                |               |      |    |
|        | もも  | コガネムシ類<br>アブラムシ類<br>モモハモグリガ<br>シンクイムシ類 |                  | 2000～4000          |         |      | 収穫7日前まで        |               |      |    |
| ネクタリン  | カメムシ類<br>コガネムシ類   | 2000                                   |                  | 収穫3日前まで            |         |      |                |               |      |    |
| ぶどう    | コナカイガラムシ類<br>チャノキイロアザミウマ<br>フタテンヒメヨコバイ  | 2000～4000                              |                  | 収穫前日まで             |         |      |                |               |      |    |
| なし     | シンクイムシ類<br>コナカイガラムシ類<br>カメムシ類、ケムシ類  |  |                  | 2000～4000          |         |      | 収穫前日まで         |               |      |    |
| うめ     | アブラムシ類<br>ケシキスイ類  | 2000                                   |                  | 収穫3日前まで            |         |      |                |               |      |    |
| あんず    | アブラムシ類  | 4000                                   |                  | 収穫3日前まで            |         |      |                |               |      |    |
| すもも    | カメムシ類<br>アブラムシ類<br>アザミウマ類<br>ツノロウムシ<br>アカマルカイガラムシ<br>コナカイガラムシ類<br>ゴマダラカミキリ<br>ケシキスイ類<br>コアオハナムグリ<br>カメムシ類、アゲハ類<br>ミカンハモグリガ<br>ミカンバエ、ミカンキジラミ<br>ミカンコナジラミ | 2000～4000                              |                  | 100ml/樹<br>200ml/樹 |         |      | 収穫150日前まで      | 1回            | 樹幹散布 |    |
| かんきつ   | ミカンハモグリガ<br>ミカンキジラミ   | 20<br>40                               |                  |                    |         |      | 10～100<br>ml/樹 | 春芽・夏芽又は秋芽の発生前 | 3回以内 | 散布 |
|        | かんきつ(苗木)  | 20                                     |                  |                    |         |      | 10～100<br>ml/樹 | 春芽・夏芽又は秋芽の発生前 | 3回以内 |    |
| かき     | アザミウマ類<br>コナカイガラムシ類<br>カキノヘタムシガ<br>カメムシ類<br>カキノヒメヨコバイ   | 2000～4000                              | 200～700<br>ℓ/10a | 収穫7日前まで            | 3回以内    | 散布   |                |               |      |    |
|        | いちじく  | アザミウマ類                                 |                  | 2000～4000          |         |      | 収穫3日前まで        |               |      |    |
| マンゴー   | コナカイガラムシ類<br>ナガカタカイガラムシ<br>ヒラタカタカイガラムシ  | 2000                                   |                  | 収穫7日前まで            |         |      |                |               |      |    |
| パパイア   | オウトウショウジョウバエ<br>カメムシ類<br>アブラムシ類   |  |                  | 2000               | 収穫3日前まで |      |                |               |      |    |
| おうとう   | アブラムシ類  | 2000                                   |                  | 収穫前日まで             | 2回以内    |      |                |               |      |    |
| ブルーベリー | ケムシ類  | 2000～4000                              |                  | 収穫45日前まで           | 3回以内    |      |                |               |      |    |

### 希釈早見表



| 希釈倍数  | 水量  | 20 ℓ | 100 ℓ | 500 ℓ |
|-------|-----|------|-------|-------|
| 2000倍 | 10g |      |       |       |
| 4000倍 | 5g  |      |       |       |

4000倍の場合、125gボトル1本で500ℓの薬液ができます。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届くところには置かないでください。

この印刷物の記載内容は2010年2月現在のものです。