

殺虫剤

# トラサイド<sup>®</sup>A 乳剤

マラソン・MEP乳剤

カニキリムシ類  
コスカシバ等の防除に!!

樹皮下の幼虫に  
優れた効果!



サンケイ化学株式会社

# トラサイド<sup>®</sup>A 乳剤

農林水産省登録 第14166号  
 有効成分：マラソン 10.0%  
 MEP 40.0%  
 性状：黄褐色可乳化液体  
 毒性：普通物 (毒劇物に該当しないものを指している通称)  
 有効期限：3年  
 包装：500ml瓶×20

特殊浸透性活性剤を配合した製剤なので、樹皮内に潜入した幼虫に優れた殺虫効果を示します。

## 適用病害虫名および使用方法

2011年4月20日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量 (10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラソンを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数	
ぶどう	ブドウトラ カミキリ	200~ 300倍	200~ 700L	発芽前(休眠期)	2回以内	散布	6回以内	4回以内 (収穫終了後から萌芽までは 2回以内、萌芽後は2回以内)	
みかん	カミキリムシ類	100~ 200倍	-	産卵最盛期~幼虫食入初期 但し収穫14日前まで	1回	樹幹部に十分散布	5回以内	5回以内 (樹幹処理は1回以内)	
もも	コスカシバ	200~ 300倍		収穫後~発芽前 (幼虫食入期)		3回以内		樹幹及び主枝に 十分散布する	3回以内
ネクタリン					2回以内		2回以内		
すもも					200倍		2回以内		
桑	カミキリムシ類	100~ 200倍	100~ 300L	発芽前(3~4月) 及び夏切直後	6回以内	散布	6回以内	6回以内	
		100倍	晩秋期						
りんご	キクイムシ類	200倍	-	産卵初期~産卵最盛期直前 但し収穫30日前まで	3回以内	樹幹部に十分散布	5回以内 (休眠期から芽出直後 までは1回以内)	3回以内	
	リンゴアナアキ ゾウムシ			4~7月 但し収穫30日前まで					地際部灌注
なし				カミキリムシ類	6~7月(産卵初期~産卵最盛期直前) 但し収穫21日前まで	5回以内	樹幹部に十分散布	5回以内 (休眠期は1回以内)	
	キクイムシ類			4~7月 但し収穫21日前まで					
おうとう	リンゴアナアキ ゾウムシ	3L/樹	-	7~8月 (幼虫食入期)	1回	地際部灌注	5回以内 (休眠期の50倍希釈 散布は1回以内)	2回以内 (樹幹処理及び灌注 処理は合計1回以内)	
	コスカシバ			収穫後~萌芽前 (幼虫食入期)		樹幹及び主枝に 十分散布する			
くり	カミキリムシ類	100~200倍	200~700L	裂果前但し収穫14日前まで	2回以内	樹幹部に十分散布	4回以内	4回以内 (樹幹処理は1回以内)	
	クリタマバチ			発芽直前		散布			
かき	ヒメコスカシバ	200倍	-	産卵期~幼虫食入初期 但し収穫45日前まで	2回以内	樹幹部に十分散布	4回以内	3回以内 (樹幹処理は2回以内)	

### ⚠ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤が他の農作物の葉にかかるとう薬害を生ずるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布してください。
- ぶどうの休眠期、くりの発芽直前に使用する場合、使用時期が遅れると新芽、新葉に薬害を生ずるので、時期を失しないよう注意してください。
- ぶどうに使用する場合、本剤は開花の日以前の使用であるので安全使用基準に該当しないが、MEPを含む農薬の使用回数は2回以内と決められているので留意してください。
- カミキリムシ防除に使用する場合は残効性が短く、使用時期を失すると効果が劣るので適期に散布するように注意してください。産卵最盛期~幼虫食入期が本剤散布の適期です。なお、カミキリムシ類成虫の発生が長引く場合は、産卵最盛期直前と幼虫食入期の2回散布が効果的です。
- 散布液が葉にかかるとう薬害を生ずるので、樹幹部のみに散布してください。特に新葉時期の散布は薬害を生じやすいので注意してください。
- 調製した散布液はその日のうちに使用してください。
- 雨天や降雨直後の散布は殺虫効果が劣るのでさけてください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用はさけてください。
- 本剤のみかんに使用する場合は、コート薬剤と混合して散布しても構いません。
- 桑に使用する場合は、発芽前(3~4月)及び夏切直後に薬液がしたたり落ちる程度に十分散布してください。発芽後の散布は薬害を生ずるので使用しないでください。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(魚類、甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所に置かないでください。

NIK-TA2014.7S

### 取扱い



## サンケイ化学株式会社

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野 7-6-11 ☎(03) 3845-7951  
 東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目 13-1 ☎(048) 551-2122  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府淀川区西中島 4丁目 5-1 ☎(06) 6305-5871