

誘引剤

メチルフェニルアセタート剤

性状：類白色円柱状固体

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

包装：50g×4×10

アカネコール[®]

有効成分：メチルフェニルアセタート………80.0%

アカネコール[®]は、サンケイ化学(株)の登録商標です。

特長

- アカネコールはスギノアカネトラカミキリ成虫に対し最も誘引効果の高い誘引物質「メチルフェニルアセタート」を、主成分とする誘引剤です。
- 専用の黄色トラップは、スギノアカネトラカミキリ成虫がよく集まる花の色をモデルにしており、アカネコールの誘引性能を高め、確実に誘引捕獲します。
- アカネコールは設置してから約2か月間有効ですので、成虫の発生初期に一度設置すれば交換する必要はありません。
- アカネコールは1ha当たり10個～20個の設置で十分効果があります。従来の枝打ちによる防除と比べ短時間の作業で防除が可能になります。
- アカネコールは、石鹸やたばこの香料に使われている成分で、トラップに誘引して捕獲する方式ですので、自然環境にやさしく、水源地や住宅地の周辺でも使用できます。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	使用時期	使用目的	使用方法
すぎひのき	スギノアカネトラカミキリ成虫	成虫発生初期～発生終期まで	誘引	本剤1個(50g)を取り付けたトラップを1ha当たり10～20個設置する。

使用方法

- ①本剤を使用する際には、専用の黄色トラップを使用して下さい。
 - ②本剤はポリプロピレン樹脂の容器に入っておりますので、使用前に容器のふたを取りはずし、容器のままトラップの誘引剤設置部に1個取り付けてください。
 - ③トラップは被害林内の周囲からよく見えるような高いところに設置して下さい。対象樹木の力枝のすぐ下付近に設置するとより効果的です。この場合、消車等を使用すると便利です。
 - ④トラップの捕虫用バケツに、水1～2ℓと中性洗剤を少量入れ、さらに防腐効果のある食塩を30g程度入れてください。
 - ⑤トラップを設置する樹木の近くに下記植物が開花している場合は、誘引作用に影響を与えるので、できるだけ除去するよう心掛けてください。
- 対象植物名：サンショウ、ミスキ、ミヤマガズミ、コゴメツギ、ガズミ、クリ、ヤグルマソウ、マユミ、ゴトズル等

使用上の注意事項

- 本剤はスギノアカネトラカミキリの成虫を誘引するので、成虫発生初期に使用して下さい。成虫は最高気温20℃以上平均気温15℃以上の日が数日続くと(3月下旬頃)発生するので、これを目安とします。
- 本剤には殺虫効果がないのでトラップを併用して捕獲してください。
- トラップ当たり本剤を1個取り付けます。トラップの設置個数は1ha当たり10個を基本とし、林況、地形等によっては、10～20個の範囲で適宜調整し、設置してください。
- 本剤の効果持続期間は約2ヶ月間です。
- トラップを設置する際には次の事項に注意してください。
 - ①トラップは被害林内でも周りから見えるような高い所に設置します。設置箇所の選定に当たっては周辺の林況、地形等を考慮してください。
 - ②トラップは風の強く当たるところは避け、落下しないように設置してください。
 - ③トラップの水は5分目程度入れ、中性洗剤を少量入れます。また、蒸発あるいは大雨等で水量に増減が生じた場合は、水及び中性洗剤を適時調整してください。
- 使用済みの容器は林内に捨てないように注意し、持ち帰って適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用時期、使用量、使用方法等を誤らないように注意し特に初めて使用する場合には、林業関係試験機関等の指導を受けてください。
- 直射日光があたらない低温な場所に密封して保管してください。