

殺虫剤

クロチアニジン水和剤

モリエート® SC

有効成分：クロチアニジン………30.0%

農林水産省登録 第 21267 号

(住友化学㈱登録)

性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

有効年限：2年

包装：500ml×20

モリエート®は、住友化学㈱の登録商標です。

特長

- ネオニコチノイド系化合物を有効成分とした殺虫剤です。
- 成虫発生初期の1回散布でワンシーズンの防除が可能です。
- 使用時の希釈倍数が800～1000倍ですので、単位面積あたりの製剤使用量が少なく作業の効率化が可能です(無人ヘリコプター散布は100倍)。
- 墓石、車の塗装にも悪影響を及ぼしません。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農業の総使用回数
まつ(生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	800倍	3ℓ/本 (樹高10m)	成虫の発生期	4回以内	散布	4回以内
		1000倍		成虫の発生初期及び発生最盛期直前			
		100倍	3ℓ/10a				

注意事項

- 使用前にはよく振って使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 激しい降雨の予想される場合は使用をさけてください。
- 本剤によるマツノマダラカミキリ成虫防除は後食防止を目的とするものであり、成虫の発生直後又は発生初期に時期を失しないように散布し、更に20日後(成虫発生最盛期直前)にもう一度散布すると効果的です。
- 蚕に対して影響があるので、桑に付着する恐れがある地域では使用しないでください。
- ミツバチを放飼している地域では使用を避けてください。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等には流さず、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
 - 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - 散布にあたっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - 散布中、薬液の漏れのないように機体の配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - 特定の農薬(混用可能が確認されているもの)を除いて原則として他の農薬との混用は行わないでください。
 - 散布終了後は次の事項を守ってください。
 - ・使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
 - ・使用残りの薬液は必ず安全な場所に責任者を決めて保管してください。
 - ・機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃棄液は適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に關係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。