

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ベフトップジンフロアブル

登録番号：農林水産省登録 第21860号(日本曹達株)

有効成分：イミノダジンを酢酸塩……………15.7%

チオファネートメチル……………26.2%

毒性：劇物

販売エリア：宮崎県・鹿児島県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『ベフトップジンフロアブル』が9月2日付けで下記のように適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「小麦」の適用病害虫名「うどんこ病」に希釈倍数「1000倍」を追加し「800～1000倍」とする。
- ・作物名「小麦」の使用方法「無人ヘリによる散布」の記載を「無人ヘリコプターによる散布」に変更。
- ・作物名「みかん」及び「かんきつ(みかん除く)」に適用病害虫名「貯蔵病害(炭疽病)」を追加。

#### 【適用病害虫の範囲および使用方法】

##### 【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノダジンを含む農薬の総使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
小麦	赤かび病	800～1000倍	60～180L/10a	収穫14日前まで	3回以内(出穂期以降は1回以内)	散布	4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内)	4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内)
		8倍	0.8L/10a					
	うどんこ病	800～1000倍	60～180L/10a	根雪前		無人ヘリコプターによる散布		
	紅色雪腐病	750倍						
みかん	貯蔵病害(青かび病、緑かび病、軸腐病、こうじかび病、黒腐病、炭疽病)	1500倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人ヘリ散布は合計5回)	
かんきつ(みかん除く)							2回以内	8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内)



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588  
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951