

サンケイ化学 農薬登録情報

キルパー

登録番号: 農林水産省登録 第18525号(株)バックマンラボラトリーズ
有効成分: カーバムナトリウム塩・・・30.0%
毒性: 普通物
販売エリア: 全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『キルパー』が8月19日付けで下記のように適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「やまいも」の適用病害虫・雑草名「根腐病」及び「一年生雑草」を追加。
- ・作物名「ばれいしょ」の適用病害虫・雑草名「そうか病」及び「一年生雑草」を追加。
- ・作物名「にんにく」の適用病害虫・雑草名「乾腐病」及び「一年生雑草」を追加。
- ・作物名「花き類・観葉植物」の適用病害虫・雑草名「萎凋病(フザリウム菌)」「萎黄病(フザリウム菌)」「球根腐敗病(フザリウム菌)」「腐敗病(フザリウム菌)」「葉枯病(フザリウム菌)」「立枯病(フザリウム菌)」「乾腐病(フザリウム菌)」「苗立枯病(リゾクニア菌)」「茎腐病(リゾクニア菌)」「葉腐病(リゾクニア菌)」「腰折病(リゾクニア菌)」「株腐病(リゾクニア菌)」「立枯症(リゾクニア菌)」「ネオブセンチュウ」「ネグサレセンチュウ」及び「一年生雑草」を追加し、既登録の「カーネーション」「きく」「トルコキキョウ」及び「ゆり」を「花き類・観葉植物」に含める。
- ・作物名「レタス」及び「非結球レタス」の適用病害虫名「根腐病」の使用量「原液として40～60L/10a」を「原液として60L/10a」に変更。
- ・作物名「たばこ」の適用病害虫名「立枯病」の使用量「所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し鎮圧する」を「所定の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する」に変更。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物

作物名	適用病害虫雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カーバムナトリウム塩を含む農薬の総使用回数
レタス	根腐病	原液として60L/10a	は種又は定植の10～24日前まで	1回	所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆又は覆土鎮圧する 所定量の薬液を土壌表面に散布し直ちに混和し被覆する 所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆又は覆土鎮圧する 所定の薬液を土壌表面に散布し直ちに混和し被覆する	1回
	一年生雑草 ネグサレセンチュウ	原液として40～60L/10a				
	ビッグベイン病 すそ枯病					
非結球レタス	根腐病	原液として60L/10a				
	一年生雑草 ネグサレセンチュウ	原液として40～60L/10a				
	ビッグベイン病 すそ枯病					
一年生雑草	原液として60L/10a					
やまのいも	根腐病 一年生雑草	原液として60L/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	所定の薬液を土壌表面に散布し直ちに混和し被覆する 所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆又は覆土鎮圧する	1回
にんにく	乾腐病 一年生雑草					
ばれいしょ	そうか病 一年生雑草					
たばこ	立枯病	原液として60L/10a	秋季(翌春植えつけ)	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し直ちに混和し被覆する 所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆又は覆土鎮圧する	1回
	ネコブセンチュウ	原液として40L/10a				
花き類・観葉植物	萎凋病(フザリウム菌) 萎黄病(フザリウム菌) 球根腐敗病(フザリウム菌) 腐敗病(フザリウム菌) 葉枯病(フザリウム菌) 立枯病(フザリウム菌) 乾腐病(フザリウム菌)	原液として60L/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	予め被覆した内で所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布又は灌水する 所定量の薬液を土壌表面に散布し直ちに混和し被覆する	1回
	萎凋病(フザリウム菌) 萎黄病(フザリウム菌) 球根腐敗病(フザリウム菌) 腐敗病(フザリウム菌) 葉枯病(フザリウム菌) 立枯病(フザリウム菌) 乾腐病(フザリウム菌) 苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病(リゾクトニア菌) 葉腐病(リゾクトニア菌) 腰折病(リゾクトニア菌) 株腐病(リゾクトニア菌) 立枯症(リゾクトニア菌)					
	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ 一年生雑草	原液として40～60L/10a			所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆又は覆土鎮圧する	



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
 東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951