

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	ベンゾビシクロンをを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ(北海道、東北) オモダカ ミスガヤツリ(北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ クログワイ(北海道を除く)	移植後5日～ルエ2.5葉期 但し移植後30日まで	砂壤土	1kg/10a	1回	湛水散布	全域(関東・東山・東海を除く)の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内
	コウキヤガラ(関東・東山・東海、九州) シスイ(東北)									
	アオミドロ・藻類による表層剥離									
	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ(北海道、東北) オモダカ ミスガヤツリ(北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ クログワイ(北海道を除く)		砂壤土～ 植土				関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯			
	コウキヤガラ(関東・東山・東海、九州) シスイ(東北)									
アオミドロ・藻類による表層剥離										



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
 東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951