

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイクレマートU粒剤

登録番号：農林水産省登録 第14654号
有効成分：ブタミホス・・・3.0%
毒性：普通物
販売エリア：全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品『クレマートU粒剤』が11月4日付けで下記のように適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「パセリ」の適用雑草名「一年生広葉雑草」を追加。
- ・作物名「せり」の適用雑草名「水田一年生雑草」を追加。
- ・全ての適用作物の適用雑草名「畑地一年生雑草」を「一年生雑草」に変更。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ブタミホスを含む農薬の総使用回数	
たまねぎ (春播栽培)	一年生雑草	定植後(雑草発生前) 但し収穫60日前まで	砂壤土～埴土	5～7kg/10a	1回	全面土壌散布	全域	1回	
たまねぎ (秋播栽培)		定植・マルチ前 (雑草発生前)		4～6kg/10a					
すいか メロン		定植前～定植直後 (雑草発生前)							
きゃべつ		定植活着後 (雑草発生前) 但し定植10日後まで				全面土壌散布			
トマト		植付後萌芽前 (雑草発生前)							全域 (北海道をのぞく)
ねぎ わけぎ あさつき		は種後発芽前 (雑草発生前)							
やまのいも さといも にんにく									
ばれいしょ									
らっかせい にんじん									
パセリ	一年生広葉 雑草								

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ブタリスを含む農薬の総使用回数
こんにやく	一年生雑草	植付後又は培土後 (雑草発生前) 但し収穫120日前まで	砂壤土～埴土	4～6kg/10a	1回	全面土壌散布	全域	1回
かんしょ		挿苗後(雑草発生前) 挿苗3日後まで						
にら		定植後(雑草発生前) 但し定植10日後前まで						
きゅうり		定植前(雑草発生前) 定植後(雑草発生前) 但し定植10日後前まで						
くわい	水田一年生雑草	植付後出芽前 (雑草発生前)		5kg/10a		畦間、株間 土壌散布		
せり	水田一年生雑草	親株養成期 (雑草発生前)	埴土	3～5kg/10a		湛水散布		
やまのいも (むかご)	一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草発生前)	砂壤土～埴土	4kg/10a	3回以内	全面土壌散布	全域	3回以内
きく		定植後(雑草発生前)						
つつじ類 さざんか		植付後又は生育期 (雑草発生前)		4～6kg/10a				
桑		春季桑発芽前及び 夏季収穫後発芽前 (雑草発生前)		8～10kg /10a				
たばこ(折衷 マルチ栽培)		植付10日前まで (雑草発生前)		4kg/10a				

<注意事項について>

【変更前】

くわいに使用する場合、砂質土壌の水田や漏水田(減水深2cm/日以上)への使用は避けること。また、散布後少なくとも7日間はそのまま湛水状態を保ち、落水、かけ流しはしないこと。

【変更後】

くわい、せりに使用する場合、砂質土壌の水田や漏水田(減水深2cm/日以上)への使用は避けること。また、散布後少なくとも7日間はそのまま湛水状態を保ち、落水、かけ流しはしないこと。



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951