

サンケイ化学 農薬登録情報

スタークル顆粒水溶剤

登録番号：農林水産省登録 第20811号(登録：三井化学アグロ株)

有効成分：ジノテフラン・・・20.0%

毒性：普通物

販売エリア：九州

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『スタークル顆粒水溶剤』が12月16日付けで下記のように適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「せり(水耕栽培)」及び「クレソン」の適用病害虫名「アブラムシ類」を追加。
- ・作物名「てんさい」の適用病害虫名「テンサイモグリハナバエ」に希釈倍数「100～240倍」使用液量「6L/ペーパーポット6冊(3L/m²)」を追加。
- ・作物名「ぶどう」に適用病害虫名「カメムシ類」を追加。
- ・作物名「りんご」及び「なし」の適用病害虫名「クワコナカイガラムシ」を「コナカイガラムシ類」に変更。
- ・作物名「花き類・観葉植物(ばら、きく、ガーベラを除く)」「きく」及び「ばら」に適用病害虫名「コナジラミ類」を希釈倍数「2000倍」使用方法「灌注」で追加。
- ・作物名「花き類・観葉植物(ばら、きく、ガーベラを除く)」「ガーベラ」及び「ばら」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を希釈倍数「1000倍」使用方法「灌注」で追加。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジネフランを含む農薬の総使用回数						
クレソン	—	アブラムシ類	3000倍	100~300L /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内						
りんご	—	アブラムシ類 キンモンホリガ シンクイムシ類 キンモンハモグリガ カメムシ類	2000倍	200~700L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内						
なし		コナカイガラムシ類												
		アブラムシ類 シンクイムシ類 カメムシ類												
ぶどう		コナカイガラムシ類												
		カメムシ類												
てんさい		フタテンヒメコバエ チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類							1000~2000倍	100~300L /10a	移植前	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内)
		カメノコハムシ							100~200倍	5Lペーパーポット6冊(2.5L/m ²)				
		テンサイモグリハナバエ							100~240倍	6Lペーパーポット6冊(3L/m ²)				
		テンサイトビハムシ							100~200倍	5Lペーパーポット6冊(2.5L/m ²)				
										100~240倍	6Lペーパーポット6冊(3L/m ²)			
せり(水耕栽培)	ガラス等の施設	アブラムシ類	2000倍	100~300L /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内						
ガーベラ	—	アブラムシ類 コナジラミ類	2000~3000倍	100~300L /10a	発生初期	4回以内	散布	5回以内 (定植後は4回以内)						
ばら		ハモグリバエ類	1000倍	1L/m ²			灌注							
		アブラムシ類	2000~3000倍	100~300L /10a			5回以内		散布					
きく		コナジラミ類	2000倍	100~300L /10a					4回以内	散布				
		ハモグリバエ類	1000~2000倍	1L/m ²			灌注							
花き類・観葉植物(ばら、きく、ガーベラは除く)		アブラムシ類	2000~3000倍	100~300L /10a			4回以内		散布					
		コナジラミ類	2000倍	100~300L /10a					散布					
		ハモグリバエ類	1000倍	1L/m ²					灌注					

<注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951