

平成 23 年 4 月 25 日
サンケイ化学株式会社

新規園芸用殺虫剤「ディアナSC」「ディアナWDG」
水稲用殺虫殺菌剤「スタウトダントツディアナ箱粒剤」
の販売について

拝啓 春暖の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では住友化学(株)登録の新規殺虫剤「ディアナSC」「ディアナWDG」および水稲箱育苗殺虫殺菌剤「スタウトダントツディアナ箱粒剤」（いずれも平成 23 年 3 月 29 日付登録取得）につきまして下記地区および日程で販売を開始いたします。

なお、ご参考までに各剤の登録取得内容を添付いたします。

敬具

記

販売開始日

○ディアナSC	平成 23 年 4 月 25 日（月）
○ディアナWDG	平成 23 年 5 月 16 日（月）
○スタウトダントツディアナ箱粒剤	平成 23 年 4 月 25 日（月）

販売地区

三剤とも鹿児島県・宮崎県・熊本県

以上

●ディアナ.SCの登録内容

【 名 称 】：ディアナ.SC

【 登 録 番 号 】：第22910号

【 有 効 成 分 】：スピネトラム…11.7%

【適用と使用法】：以下のとおり

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	使用方法	本剤の 使用回数	スピネトラムを 含む農薬の 総使用回数
トマト ミニトマト	ハモグリハエ類	2,500～ 5,000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	散布	2回以内	2回以内
なす	アザミウマ類	2,500倍					
キャベツ	コナガ、アオムシ タマキ、シウワバ ハイマダ、ラノメカ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2,500～ 5,000倍					
	ネギアザミウマ	2,500倍					
ねぎ	ネギハモグリハエ						
レタス 非結球 レタス	ハモグリハエ	2,500～ 5,000倍	200～ 400L/10a	摘採 7日前まで	1回	1回	
いちご	アザミウマ類						
茶	チャノキイロアザミウマ チャノコクモンハマキ チャノホソカ チャハマキ ヨモギエダシヤク						

●ディアナ.WDGの登録内容

【 名 称 】：ディアナ.WDG

【 登 録 番 号 】：第22909号

【 有 効 成 分 】：スピネトラム…25.0%

【適用と使用法】：以下のとおり

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用量	使用時期	使用方法	本剤の 使用回数	スピネトラムを 含む農薬の 総使用回数
りんご	キンモンホリカ シクイムシ類 ハマキムシ類	5,000～ 10,000倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	散布	2回以内	2回以内
なし	シクイムシ類						
もも	モモハモグリガ						

●スタウト・ダントツ・ディアナ・箱粒剤の登録内容

【名称】：スタウト・ダントツ・ディアナ・箱粒剤

【登録番号】：第22912号

【有効成分】：クロチアニジン…1.5%、スピネトラム…0.50%、
イソチアニル…2.0%

【適用と使用方法】：以下のとおり

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲 (箱育苗)	いもち病 イネノメイガ ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネノムシ フタホシコヤカ ニカメイチュウ コブノメイガ	育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌約 5L) 1箱当り 50g	移植3日前～ 移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に散布する
	イネズゾウムシ		移植当日		

クロチアニジンを含む農薬 の総使用回数	スピネトラムを含む農薬 の総使用回数	イソチアニルを含む農薬 の総使用回数
4回以内 (移植時までの処理は 1回以内、本田での散布、 空中散布、無人ヘリ散布は 合計3回以内)	1回	3回以内 (移植時までの処理は 1回以内、本田では 2回以内)