

サンケイ化学 農薬登録情報

ゼータワンフロアブル

登録番号: 農林水産省登録 第22836号(登録会社: 住友化学株)

有効成分: プロピリスルフォン... 1.7%

毒性: 普通物

販売エリア: 熊本県、宮崎県、鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い製品『ゼータワンフロアブル』が平成23年7月20日付けで下記のように適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「エゾサヤカグサ(北海道)」「シズイ(東北)」「オモダカ」「クログワイ(北海道除く)」及び「コウキヤガラ(東北、関東、東山、東海、九州)、作物名「移植水稻」の適用雑草名「セリ(北陸、九州を除く)」を「セリ」に変更。
- ・作物名「移植水稻」の使用時期「移植後5日～ルE2. 5葉期ただし移植後30日まで」から「移植後5日～ルE3葉期ただし、移植後30日まで」に変更。
- ・作物名「移植水稻」の適用地帯「全域(東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯」の適用土壌を「壤土～埴土」から「砂壤土～埴土」に変更し、適用地帯を「全域の普通期及び早期栽培地帯」に変更。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	プロピリスルフォンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミスガヤツリ(北海道を除く) ヘラオモダカ(北海道、東北) ヒルムシロ セリ エゾサヤカグサ(北海道除く) シズイ(東北) オモダカ クログワイ(北海道除く) コウキヤガラ(東北、関東、東山、東海、九州)	移植後5日～ルE3葉期、ただし移植後30日まで	砂壤土～埴土	500mL/10a	2回以内	原液湛水散布	全域の普通期及び早期栽培地帯	2回以内

<注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951