

サンケイ化学 農薬登録情報

スタークル顆粒水溶剤

登録番号: 農林水産省登録 第20811号(登録会社: 三井化学アグロ(株))

有効成分: ジノテフラン・・・20.0%

毒性: 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

販売エリア: 九州全県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い製品『スタークル顆粒水溶剤』が平成24年4月26日付けで下記のように適用拡大されました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「とうがらし類」に適用病害虫名「コナジラミ類」を追加。
- ・作物名「にがうり」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「2回以内」から「3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)」に変更。
- ・作物名「だいこん」の適用病害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数「3000倍」から「2000～3000倍」に変更。
- ・作物名「だいこん」に適用病害虫名「キスジ/ミハムシ」を追加。
- ・作物名「かぶ」に適用病害虫名「キスジ/ミハムシ」を追加。
- ・作物名「ねぎ」に適用病害虫名「シロイモシヨウトウ」を使用方法「灌注」で追加。
- ・作物名「ねぎ」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「4回以内(育苗トレイの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)」から「4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)」に変更。
- ・作物名「にら」の適用病害虫名「ネキアザミウマ」及び「アブラムシ類」を追加。
- ・作物名「アスパラガス」の適用病害虫名「アザミウマ類」「ジュウホシクビナガハムシ」及び「コナジラミ類」を追加。
- ・作物名「にんじん」の使用方法「株元灌注」の使用時期を「生育期但し、収穫45日前まで」から「生育期 但し、収穫21日前まで」に変更。
- ・作物名「にんじん」の使用方法「散布」の使用時期を「収穫30日前まで」から「収穫7日前まで」に変更。
- ・作物名「非結球レタス(リーフレタスを除く)」に適用病害虫名「ハスモンヨウトウ」「アブラムシ類」及び「ナメグリバエ」を使用方法「灌注」で追加し、作物名「リーフレタス」と「非結球レタス(リーフレタスを除く)」を統合し「非結球レタス」とし、使用方法「散布」の使用時期を「収穫3日前まで」とする。
- ・作物名「レタス」及び「非結球レタス」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「4回以内(は種時の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)」に変更。
- ・作物名「非結球あぶらな科野菜類(チンゲンサイを除く)」の適用病害虫名「アブラムシ類」及び「キスジ/ミハムシ」を追加し、作物名「こまつな」及び「みずな」にこれを含める。
- ・作物名「なばな類」の適用病害虫名「アブラムシ類」及び「キスジ/ミハムシ」を追加。
- ・作物名「だいこん」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)」から「5回以内(は種時の粒剤の播溝土壌混和は1回以内、は種時の粒剤の全面土壌混和は1回以内、生育期の粒剤の散布は1回以内、生育期の水溶剤の散布は2回以内)」に変更。
- ・作物名「かんしょ」の適用病害虫名「コナジラミ類」を追加。
- ・作物名「きゅうり(葉)」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫3日前まで」に変更。
- ・作物名「きゅうり(花)」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫前日まで」に変更。
- ・作物名「食用カーネーション」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫3日前まで」に変更。
- ・作物名「キウイフルーツ」の適用病害虫名「カメムシ類」を追加。
- ・作物名「うめ」及び「小粒核果類(うめを除く)」を統合し「小粒核果類」とし、使用時期を「収穫前日まで」、本罪の使用回数及びジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内」に変更。
- ・作物名「ぶどう」の使用方法「散布」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫前日まで」に、本罪の使用回数を「2回以内」から「3回以内」に変更。
- ・作物名「ぶどう」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「2回以内(塗布は1回以内)」から「3回以内(塗布は1回以内)」に変更。
- ・作物名「みかん」と「かんきつ(みかんを除く)」を統合し「かんきつ」とし、使用時期を「収穫前日まで」、本罪の使用回数及びジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3回以内」に変更。
- ・作物名「びわ」の適用病害虫名「カメムシ類」を追加。
- ・作物名「食用トネア」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫3日まえまで」に変更。
- ・作物名「しそ(花穂)」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫3日前まで」に変更。
- ・作物名「ズッキーニ」の適用病害虫名「アブラムシ類」を追加。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

平成24年4月26日の拡大内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメフランを含む農薬の総使用回数
とうがらし類	コナジラミ類	2000～3000倍	100～300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
にがうり	コナジラミ類	2000倍					
レタス	アブラムシ類	2000～3000倍	セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊(30X60cm・使用土壌1.5～4L)当り0.5L	収穫3日前	1回	灌注	4回以内(は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
	ナメグリハエ	50～100倍					
	ハスモンヨトウ	50倍					
非結球レタス	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300L /10a	収穫3日前	2回以内	散布	4回以内(は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
	ナメグリハエ	50～100倍	セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊(30X60cm・使用土壌1.5～4L)当り0.5L	定植前日～定植時	1回	灌注	
	ハスモンヨトウ	50倍					
だいこん	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300L /10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	5回以内(は種時の粒剤の播溝土壌混和は1回以内、は種時の粒剤の全面土壌混和は1回以内、生育期の粒剤の散布は1回以内、生育期の水溶剤の散布は2回以内)
	キスジノミハムシ	1000倍					
かんしょ	コナジラミ類	2000倍	100～300L /10a	収穫3日前まで	1回	散布	1回
かぶ	アブラムシ類	3000倍	100～300L /10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
	キスジノミハムシ	2000倍					
ねぎ	シロイモジヨトウ	50倍	セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊(30X60cm・使用土壌1.5～4L)当り0.5L	定植前日～定植時	1回	灌注	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回)
にんじん	トビロヒョウタンゾウムシ	400倍	0.4L/m ²	生育期、但し収穫21日前まで	1回	株元灌注	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)
	アブラムシ類	2000倍	100～300L /10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	
非結球あからな科葉菜類(チンゲンサイを除く)	アブラムシ類	3000倍	100～300L /10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
	キスジノミハムシ	2000倍					
なばな類	アブラムシ類	3000倍	100～300L /10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
	キスジノミハムシ	2000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジネフランを含む農薬の総使用回数					
小粒核果類	アブラムシ類 カメムシ類	2000倍	200～700L /10a	収穫前日 前まで	3回以内	散布	3回以内					
ぶどう	カメムシ類 ブドウウラガミキリ						3000倍	3回以内(塗布は1回以内)				
	チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	1000～2000倍					3回以内					
かんきつ	チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	1000倍						2000倍				
	ゴマダラカミキリ											
	アブラムシ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 コアオハナムグリ ケシクスイ類 ミカンハエ アカマルカイガラムシ ヤノネカイガラムシ サンホーゼカイガラムシ ミカンキジラミ コナジラミ類 チャノドリヒメコバエ											
	バジル	コナジラミ類 アブラムシ類					3000倍		100～300L /10a	収穫3日 前まで	2回以内	2回以内
	しそ科野菜 類(バジルを 除く)	アブラムシ類										
	きゅうり(葉)	アブラムシ類 コナジラミ類										
きゅうり(花)												
しそ(花穂)	アブラムシ類											
食用カーネーション												
食用トレニア												
にら	ネギアザミウマ	400倍	0.4L/m ²	生育期、 但し収穫 14日前 まで	1回	株元灌注	3回以内(成育中の株元灌 注は1回以内、散布は2回以 内)					
	アブラムシ類	2000倍	100～300L /10a	収穫前日 前まで	2回以内	散布	3回以内					
アスパラガス	アザミウマ類 シユソフホソソコアガハ ミシ コナジラミ類		100～800L /10a		3回以内							
キウイフルーツ	カメムシ類	1000～2000倍	200～700L /10a	2回以内	2回以内	2回以内						
びわ												
ズッキーニ	アブラムシ類	2000倍	100～300L /10a	2回以内	2回以内							

<注意事項について>

注意事項については製品に貼付してあるラベルをご参照下さい



本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
 東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951
 深谷 技術普及部 TEL:048-551-2122