

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ソイリーン

登録番号 : 農林水産省登録 第22163号(登録会社:三井化学アグロ(株)登録)  
有効成分 : クロピクリン.....40.0%  
                  1,3-ジクロロプロペン...52.0%  
毒性 : 劇物  
販売エリア : 熊本県、宮崎県、鹿児島県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『ソイリーン』が平成25年6月12日付けで下記のように適用拡大されました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「かぶ」の追加。
- ・作物名「こまつな」の追加。
- ・作物名「レタス」の追加。
- ・作物名メロンのクロピクリンを含む農薬の総使用回数「1回」から「2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)」に変更。

#### 【適用病害虫の範囲および使用方法】

##### 【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロピクリンを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数
こまつな	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20~30L /10a(1穴当り2~3ml)	作付の10~15日前	1回	耕起整地後、30cm間隔の柵り状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土しポリエチレン、ビニール等で被覆する。	1回	1回
レタス							
かぶ							
メロン	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20~30L /10a(1穴当り2~3ml)	作付けの10~15日前	1回	耕起整地後、30cm間隔の柵り状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土しポリエチレン、ビニール等で被覆する。	2回以内 (床土1回以内、圃場1回以内)	1回
	黒点根腐病 えそ斑点病 つる割病	30L/10a(1穴当り3ml)					

#### <注意事項について>

##### 変更なし

使用上の注意事項については製品に貼付のラベルをご参照下さ



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588

東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951

深谷 技術普及部 TEL:048-551-2122