

# サンケイ化学 農薬登録情報

## スタウトダントツディアナ箱粒剤

登録番号 : 農林水産省登録 第22912号(登録:住友化学(株))

有効成分 : クロチアニジン・・・ 1.5%

スピネトラム・・・ 0.5%

インチアニル・・・ 2.0%

毒性 : 普通物(毒劇物に該当しない物を指している通称)

販売エリア : 熊本県、宮崎県、鹿児島県

## 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い製品『スタウトダントツディアナ箱粒剤』が平成26年4月23日付けで下記のように適用拡大されました。

### 【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

・作物名「稲(育苗箱)」のスピネトラムを含む農薬の総使用回数を「1回」から「3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)」に変更。

### 【適用病害虫の範囲および使用方法】

#### 【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	スピネトラムを含む農薬の総使用回数	インチアニルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯(ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 ウンカ類 ツマグロコバイ イネツトムシ フタオビコヤガ ニカメイチュウ コブノメイガ イネヒメモグリハエ イネミスゾウムシ イネドコロイムシ	育苗箱(30X60X3cm、使用土壌約5L)1箱当たり50g	移植3日前～ 移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する	4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)	3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)	3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)

### <注意事項について>

変更なし

使用上の注意事項については製品に貼付のラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588

東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951

深谷 技術普及部 TEL:048-551-2122