

サンケイ化学 農薬登録情報

ST ダコニール 1000

クマイ ダコニール 1000

TPN 水和剤

登録番号：農林水産省登録第 21759 号（登録会社：住友化学(株)）

農林水産省登録第 16824 号（登録会社：クマイ化学工業(株)）

有効成分：TPN・・・40.0%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「ダコニール 1000」が平成 27 年 6 月 24 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「オクラ」を追加する。
- ・作物名「いちじく」の適用病害虫名に「黒かび病」を追加する。
- ・作物名「たまねぎ」の適用病害虫名に「白色疫病」を追加する。
- ・作物名「茶」の「希釈倍数 700 倍」の適用病害虫名に「灰色かび病」を追加する。
- ・作物名「セルリー」の適用病害虫名に「萎縮炭疽病」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」の適用病害虫名に「根朽病」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	使用濃度	10aあたり 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	TPNを含む 農薬の総使用回数
オクラ	葉すす病	1000倍	100～300L /10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内
いちじく	疫病	2000倍	200～700L /10a	収穫前日まで	2回以内		2回以内
	黒葉腐病 黒かび病						
たまねぎ	べと病	1000倍	100～300L /10a	収穫7日前まで	6回以内		6回以内
	灰色かび病 白色疫病						
茶	炭疽病	700～1000倍	100～400L /10a	摘採10日前まで	1回		1回
	灰色かび病						
	輪斑病						
	網もち病						
	褐色円星病						
新梢枯死症 (輪斑病菌による)	1000倍						
	黒葉腐病	700倍					
	灰色かび病						
セルリー	斑点病	1000倍	100～300L /10a	収穫21日前まで	2回以内	2回以内	
	萎縮炭疽病						
キャベツ	べと病	1000倍	100～300L /10a	収穫14日前まで	2回以内	3回以内(は種または定植前の土壌混和は1回以内、散布およびエアゾル剤の噴射は合計2回以内)	
	根朽病						

【注意事項の変更について】

商品に貼付されているラベルを参照のこと



サンケイ化学株式会社

本 社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9番地	TEL:(099)268-7588
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮三丁目6-19番地	TEL:(0985)25-7051