

# サンケイ化学 農薬登録情報

## サンケイ スミチオン乳剤

登録番号: 農林水産省登録 第5052号(登録会社: サンケイ化学(株))

有効成分: MEP...50.0%

毒性: 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品『スミチオン乳剤』が平成27年3月18日付けで下記のように適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- 作物名「いちょう(種子)」に適用病害虫名「ヒメボクトウ」を追加する。
- 作物名「せり」および「しちとうい」を追加する。
- 作物名「あずき」の適用害虫名「フキノメイガ」を「アズキノメイガ」に変更する。

#### 【適用病害虫名および使用方法(今回の変更部分のみ記載)】

平成27年3月18日の拡大内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
いちょう(種子)	ヒメボクトウ	100倍	0.3~3 L/樹	収穫60日前まで	3回以内	樹幹散布	3回以内
せり	アブラムシ類	2000倍	100~300 L/10a	親株養成期 但し収穫 45日前まで	2回以内	散布	2回以内
しちとうい	イネクロカメムシ	100倍	60~150 L/10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内
あずき	フキノメイガ →アズキノメイガ	1000倍	100~300 L/10a	収穫21日前まで	4回以内	散布	4回以内
	シロイチモジマダラノメイガ						
	ダイスサヤタマハエ						
	カメムシ類						
	マヒメサヤムシガ	250倍	25L/10a				
	アブラムシ類	1000~2000倍	100~300 L/10a				
マメシクイガ	1000~1500倍	100~300 L/10a					



## サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄2丁目9番地  
東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11 第一下谷ビル3F  
深谷分室 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1  
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4丁目5-1 新栄ビル内

TEL: (099)268-7588  
TEL: (03)3845-7951  
TEL: (048)551-2122  
TEL: (06)6305-5871