

# サンケイ化学 農薬登録情報

## サンケイスマイパイン乳剤

登録番号: 農林水産省登録 第15043号

有効成分: MEP 80.0%

毒性: 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社製品『サンケイスマイパイン乳剤』が4月6日付けで下記のように適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名『いぬつけ』を追加する。
- ・各作物の各使用方法における使用液量を以下のとおり変更する。

#### 【適用病害虫名および使用方法】

平成28年4月6日の拡

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む 農薬の 総使用回数
いぬつけ	オオハリセンチュウ	500倍	3~5L/株 但し、10L/m <sup>2</sup> まで	—	1回	株元灌注	6回以内
まつ (衰弱木・ 枯損立木)	キクイムシ類 ゾウムシ類	80~120倍	5~10L/本 (樹高10m)	—	6回以内	散布	6回以内
まつ	マツカレハ	1000~1500倍	200~700L/10a	—			
まつ類	ハバチ類	1500~2000倍		幼虫期			
	ハマキガ類	1000~1500倍		成虫の 発生最盛期			
	マツバノタマハエ	250倍		幼虫期			
	シンクイムシ類	250~500倍		幼虫期			
ミズツマキリエダシヤク	1000~1500倍	成虫発生期					
さくら	コスカシハ	100~300倍	—	成虫発生期	6回以内	6回以内	
樹木類 (倒木・ 伐倒木)	カミキリムシ類 (スキカミキリを除く) ゾウムシ類 キクイムシ類	50~150倍	300~600mL/m <sup>2</sup> (樹皮表面積1m <sup>2</sup> 当り)	伐倒・風倒直後 樹皮下及び 材内生息期			
	スキザイノタマハエ	50~100倍	—	樹皮下及び 材内生息期			
	スキカミキリ	100~300倍	400~600mL/m <sup>2</sup> (樹皮表面積1m <sup>2</sup> 当り)	伐倒・風倒直後 樹皮下及び 材内生息期			
樹木類	スキカミキリ	50~100倍	400~600mL/m <sup>2</sup> (樹皮表面積1m <sup>2</sup> 当り)	成虫の発生初 期又は直前	2回以内	樹幹散布	2回以内
	ガシノナガキクイムシ	50倍	500mL/m <sup>2</sup> (樹皮表面積1m <sup>2</sup> 当り)				
	スキザイノタマハエ	100~200倍	600mL/m <sup>2</sup> (樹皮表面積1m <sup>2</sup> 当り)				
	カミキリムシ類 (スキカミキリを除く) ゾウムシ類 キクイムシ類	50~150倍	300~600mL/m <sup>2</sup> (樹皮表面積1m <sup>2</sup> 当り)				
ほだ木	カミキリムシ類	350倍	300~600mL/m <sup>2</sup> (樹皮表面積1m <sup>2</sup> 当り)	成虫発生初期 及び産卵期 (ほだ木の 伏せ込み期)	2回以内	散布(ほだ木及び ほだ木用笠木を 同時に防除する 場合は希釈倍数 を350倍とする。)	2回以内
ほだ木用 笠木		40倍					

## 「使用上の注意事項」の変更

### 【追加する内容】

- (9)本剤を樹木類の樹幹散布に使用する場合は、樹皮表面積に応じて所定量をむらなく散布すること。
- (10)本剤を樹木類(倒木、伐倒木)に使用する場合は、樹皮表面積に応じて所定量をむらなく散布すること。
- (14)いぬつげのオオハリセンチュウに対しては、薬液の株元灌注後100L/m<sup>2</sup>の灌水を行うこと。



# サンケイ化学株式会社

本社	〒891-0122	鹿児島県鹿児島市南栄2丁目9番地	TEL: (099)268-7588
東京本社	〒110-0005	東京都台東区上野7-6-11 第一下谷ビル3F	TEL: (03)3845-7951
深谷分室	〒366-0032	埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1	TEL: (048)551-2122
大阪営業所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島4丁目5-1 新栄ビル内	TEL: (06)6305-5871