



サンケイ化学



炭そ病



もち病



網もち病



赤焼病



新梢枯死症

# お茶栽培に 大きな安心を!

## ■特長

- いろいろな種類の病原菌に効果があります。
- 茶の主要病害に安定した効果があります。
- 従来薬剤耐性菌にも優れた効果があります。
- 他薬剤との混用が可能です。
- 茶の汚れが少ない薬剤です。

# ベクトール®

## 水和剤

### 茶樹の総合殺菌剤

有効成分名および含有量  
 イミノクタジン酢酸塩……2.5%  
 塩基性塩化銅……73.5%  
 (銅として……44.0%)

®はサンケイ化学の  
 登録商標です。

# ベブドー<sup>®</sup> 水和剤

- 人畜毒性：普通物
- 魚毒性：B類
- 包装：500g × 20  
1kg × 20

適用病害と使用方法	作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	使用回数
	茶		炭そ病 赤焼病 ももち病 網もち病	500~700倍	摘採14日前 まで
新梢枯死症 (輪斑病菌による) 褐色円星病 灰色かび病 黒葉腐病			500倍		

## 上手な使い方



ベブドー水和剤の使用時期

月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
茶の生育	春の園揃え	一番茶生育期		二番茶生育期	三番茶生育期		秋芽生育期		秋整枝		
散布時期	↑ 赤焼病 灰色かび病			↑ 炭そ病・もち病 黒葉腐病	↑ 炭そ病・もち病・網もち病 新梢枯死症		↑				↑ 赤焼病 灰色かび病

茶芽の葉期		萌芽期～1葉期	2～3葉期	4～5葉期
茶芽の生育状況				
防除時期	二～三番茶期			
	秋芽生育期			

### ■使用上の注意

- 石灰硫黄合剤、マシン油乳剤、有機硫黄剤、有機ホ素剤等との混用はできません。
- なし、もも、うめ等の果樹には薬害を生ずることがあるので、付近にある場合にはかからないよう注意して散布してください。

★ラベルをよく読んでください。★ラベルの記載以外には使用しないでください。★小児の手の届く所には置かないでください。



JAグループ  
農協



経済連

®は登録商標です。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 ☎099(268)7588(代)  
 九州北部営業所 〒841-0025 鳥栖市曾根崎町1154-3 ☎0942(81)3808(代)  
 宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東3-6-19(山本ビル) ☎0985(25)7051  
 熊本連絡所 〒868-0014 人吉市下薩摩瀬町1604-11 ☎0966(24)2232