

# サンケイ ダースバンベイト



## ネキリムシ、



## コオロギ、

# ダンゴムシの防除に！！



サンケイ化学株式会社


# サンケイ ダースバンベイト

登録番号: 第21269号  
 有効成分: クロルピリホス 1.0%  
 性状: 淡赤色粒状  
 毒性: 普通物

## 【適用病害虫の範囲及び使用方法】


平成19年12月26日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	10アール当り使用量	使用時期	本剤及びクロルピリホスを含む農薬の総使用回数	使用方法
キャベツ	コオロギ類 ネキリムシ類	3kg	定植時	3回以内	株元処理
	オカダンゴムシ		は種又は 定植時～生育初期		
はくさい	ネキリムシ類		定植時		
	オカダンゴムシ		定植時～生育初期		
	コオロギ類				
だいこん	ネキリムシ類		収穫7日前まで	1回	




作物の株元に  
処理しましょう。

### 主な試験成績



ダースバンベイトのキャベツに対する効果 (だいこん)

平成18年 (社)日本植物防疫協会研究所  
 試験場所: 茨城県牛久市結束町535番地  
 供試作物: だいこん (健志総太り)  
 播種: 平成18年5月22日  
 発生状況: 甚発生 (放虫)  
 処理時期: 5月29日 (播種7日後)  
 調査時期: 6月8日 (処理10日後)



ダースバンベイトのキャベツに対する効果 (はくさい)

平成16年 日本植物防疫協会研究所宮崎試験場  
 試験場所: 宮崎県宮崎郡佐土原町大字下那珂  
 供試作物: はくさい (玉杯)  
 は種: 8月31日、定植: 9月16日  
 処理月日: 9月16日

### < 注意事項 >

- (1) 作物体上から作物の地際の表面に散布すること。
- (2) 雨や水がかかると効果が減少するので、圃場や庭では降雨の予想される時の使用はさけ、温室では処理後2～3日は灌水がかからないように注意すること。
- (3) 間引き菜、つまみ菜には使用しないこと。



サンケイ化学株式会社

東京都台東区上野7-6-11 第一下谷ビル3F  
 TEL: 03-3845-7951 FAX: 03-3845-7950