

播種又は定植後の常備薬！

農林水産省登録 第20919号

# ガードバイト® A

ネキリムシから大切な作物を守る！



●速効的な殺虫効果！ ●優れた被害防止効果！ ●幅広い適用作物！

サンケイ化学株式会社

# ガードベイト® A

農林水産省登録 第20919号  
有効成分:ベルメトリン 0.1%  
性状:淡赤色粒状  
毒性:普通物



## 特徴

- ★ネキリムシを誘引し、摂食させることで効果を発揮するベイト剤です。
- ★有効成分が合成ピレスロイドですので、優れた殺虫効果と被害防止効果があります。
- ★赤色の粒剤ですので、散布したところがよくわかります。

## ■適用病害虫の範囲及び使用方法

平成20年9月10日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤及びベルメトリンを含む農薬の総使用回数	使用方法
はくさい	ネキリムシ類	3kg/10a	は種時～生育初期	5回以内	株元散布
ごぼう				4回以内	
だいこん			定植時	5回以内	
キャベツ				3回以内	
レタス					
ブロッコリー					
カリフラワー				1回	
なす			生育初期	5回以内	
トマト				2回以内	
ミニトマト				4回以内	
いちご				3回以内	
にんじん					
たまねぎ					
ほうれんそう			生育初期	2回以内	
とうもろこし				4回以内	
ばれいしょ			は種時～生育初期	3回以内	
ねぎ					
わけぎ					
あさつき			生育初期	3回以内	
オクラ					
そらめめ					
さやえんどう	定植時～発芽期 但し、収穫120日前まで	4回以内			
なばな					
しょうが	収穫前日まで	3回以内			
アスパラガス					
パセリ	定植時	1回			
たばこ					
マリーゴールド	生育初期	6回以内			

## ■注意事項

- 作物体上から作物の地際の表面に散布してください。
- 虫に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の葉に付着する恐れのある場所では使用しないでください。
- 誤食などのないように注意してください。  
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。  
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布の際はマスク、手袋などをしてください。  
また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 本剤は、水産動物に強い影響を及ぼすので、河川、湖沼、海域及び養殖池に本剤が飛散・流入する恐れのある場所では使用しないでください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。  
また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光を避け、子供の手の届かないなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。



JAグループ

農協



経済連

全農は登録商標 第4702318号



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南榮2-9 ☎099(268)7588(代)  
九州北部営業所 〒841-0025 鳥栖市曾根崎町1154-3 ☎0942(81)3808(代)  
宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東3-6-19(山本ビル) ☎0985(25)7051