

天敵にやさしく。害虫にきびしい！



プレオ® フロアブル

果菜類の害虫に

なす・トマト・ミニトマト・ピーマン・とうがらし類・いちご・きゅうり・メロンの諸害虫防除に優れた効果を発揮します。





果菜類の害虫防除に プレオフロアブル®

有効成分：ピリダリル……………10.0% 人畜毒性：普通物


特長

- 新しいタイプの殺虫剤
- 鱗翅目害虫に優れた殺虫効果
- 雨に強く、優れた効果が長期間持続
- 天敵・有用昆虫に対する影響が少ない
- ローテーション散布基幹剤として有用


効果

プレオフロアブルはハスモンヨウの幼虫の齢期に関わらず、十分な殺虫効果を示します。

■ ハスモンヨウに対する齢期別の効果※



■ トマトハモグリバエに対する効果(1000倍)



【使用上の注意】

- 使用前によく振ってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調整してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除等関係機関の指導を受けてください。
- 散布液調製後は、そのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 浸透移行性に乏しいので、かけムラのないように丁寧に散布してください。

【蚕毒については次のことをご守りください】

- 桑葉にかからないように散布する。
- 桑葉にかかった場合は15日以上経過してから給桑する。

【適用作物・害虫と使用方法】

2009年1月末現在の登録内容

作物名	適用害虫名	使用時期	本剤の使用回数及びピリダリルを含む農薬の総使用回数	希釈倍数	10a当たり使用液量	使用方法
なす	ハスモンヨウ オオタバコガ ミナキイロアザミウマ ハモグリバエ類	収穫前日まで	4回以内	1000倍	100~300ℓ	散布
トマト ミニトマト	ハスモンヨウ オオタバコガ ハモグリバエ類					
ピーマン とうがらし類	タバコガ類 ミナキイロアザミウマ					
きゅうり メロン	ハモグリバエ類					
いちご	ハスモンヨウ オオタバコガ		4回以内			

これらの作物以外にキャベツ、はくさい、チンゲンサイ、ブロッコリー、レタス、リーフレタス、ねぎ、だいこん、アスパラガス、だいず、えだまめ、さやえんどう、ばれいしょ、かんしょ、さといも、きく、さく(葉)、食用さく、しそ、しそ(花穂)、バジルに登録があります。

【天敵農薬に対する影響】

プレオフロアブルは施設栽培で利用される下記天敵類に悪影響を与えないことが確認されています。(室内検定、1000倍)

対象害虫名	天敵名
アザミウマ類	タイリクヒメハナカメムシ、クメリスカブリダニ
アブラムシ類	コレマンアブラバチ、ナミテントウ、ヤマトクサカゲロウ*
コナジラミ類	オンシツツヤコバチ、サバクツヤコバチ
ハモグリバエ類	ハモグリミドリヒメコバチ、ハモグリコムバチ、イサエアヒメコバチ
ハダニ類	チリカブリダニ、ミヤコカブリダニ

*500倍で検定

【天敵農薬との体系的な利用例】

■ ナス施設栽培

※虫：ミナキイロアザミウマ数(葉100枚あたり)成・幼虫数の推移




図 タイリクヒメハナカメムシ(オリスター®A)放飼にプレオフロアブル散布を組み合わせた場合のミナキイロアザミウマに対する効果(上段)とタイリクヒメハナカメムシ数の推移(下段)(福岡県農業総合試験場 2002年)


○ タイリクヒメハナカメムシ放飼区

◆ タイリクヒメハナカメムシ放飼とプレオフロアブル散布を組み合わせた区

↓ タイリクヒメハナカメムシの放飼日を示す

▽ プレオ®フロアブル(1000倍)の散布日を示す

天敵：タイリクヒメハナカメムシ数(花と葉計100あたり)成・幼虫数の推移



● ラベルをよく読む。 ● 記載以外には使用しない。 ● 小児の手の届く所には置かない。

● 空容器は圃場等に放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる。

