

微小害虫・うどんこ病防除に！

農林水産省登録  
第20316号

殺虫殺菌剤

# サンケイリスタル<sup>®</sup> 乳剤



- ★ポジティブリスト制度の対象外物質です！
- ★使用回数制限がなく、収穫前日まで使えます！
- ★有機農産物生産(JAS)に使用できます！
- ★国の特別栽培農産物に係る  
表示ガイドラインではカウントされません！

サンケイ化学株式会社

®はサンケイ化学株の登録商標

# サンクリスタル<sup>®</sup> 乳剤

農林水産省登録 第20316号  
有効成分: 脂肪酸グリセリド 90.0%  
人畜毒性: 普通物

## 特徴

- ① 植物油脂を有効成分とする安全性の高い薬剤です。
- ② 抵抗性や耐性菌発生が少ない物理的防除剤です。
- ③ 収穫前日まで使用可能で、散布回数制限もありません。
- ④ 有機農産物生産(JAS)に使用できます。
- ⑤ 有効成分はポジティブリスト制度の対象外物質です。
- ⑥ 拡張性に優れています。

## サンクリスタル乳剤の登録内容

2008年8月27日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	脂肪酸グリセリド を含む農薬の 総使用回数
野菜類	アブラムシ類 コナジラミ類	300倍	150~500ℓ	収穫前日まで	—	散布	—
	ハダニ類 うどんこ病	300~ 600倍					
かんきつ げきつ	ミカンキジラミ	600倍	200~700ℓ	—	—	—	—
花き類 観葉植物	ハダニ類 うどんこ病		150~500ℓ				

## 上手な使い方

- 本剤は物理的に作用する剤であり、散布液が直接病害虫にかかると効果が発揮されません。病害虫にムラなくかかるよう、葉の表裏へ丁寧に十分散布しましょう。
- **1週間間隔で2~3回連用**すると効果的です。多発時は散布間隔を短縮することをおすすめします。
- 拡張性に優れるため、展着剤を加用する必要はありません(他剤との混用時も加用の必要はありません)。また、機能性展着剤の加用により薬害を生ずることがありますので、加用しないよう注意してください。
- 葉面散布肥料との混用により薬害を生ずる場合がありますので、混用はさけてください。

## 使用上の注意

- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 希釈倍数を遵守し、葉裏等に散布むらを生じないように丁寧に散布してください。
- 高温時には葉に薬害を生じることがあるので、施設では温度管理に十分注意してください。
- キャプタン水和剤およびストロビルリン系薬剤との同時施用及び近接散布は、薬害を生じる恐れがあるのでさけてください。
- 害虫に対する防除では、多発生時に効果を高める為に、数日間隔で連続散布することをおすすめします。
- なす、ピーマン、はくさい、チンゲンサイ等に使用する場合、幼苗期には葉先枯れを生じることがあるので使用をさけてください。
- 花き類・観葉植物に使用する場合は、品種、栽培条件等により花卉、苞、葉に薬害を生じる場合がありますので、事前に安全を確認して使用してください。特に結蕾期以降の散布は注意してください。
- かんきつに使用する場合は下記の注意事項を守ってください。
  - ① 品種、使用時期等によっては果実に薬害を生じる恐れがあるので、事前に安全を確認して使用してください。また樹勢が弱っている場合には散布しないでください。
  - ② ジチアノン剤との混用並びに近接散布は果実に薬害を生じるのでさけてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 幼児の手の届くところには置かないでください。