


すぐ効く、よく効く、ながく効く



自然をみつめる殺虫剤



**トレボン**<sup>®</sup> 粉剤DL

有効成分:エトフェンブロックス—0.5%

®は三井化学株式会社の登録商標です。



ツマグロヨコバイ




トビイロウンカ



セジロウンカ



ヒメトビウンカ



イネドロオイムシ



イネミスゾウムシ



イナゴ



カメムシ

水稲のウンカ・ヨコバイ類を始め、ドロオイ、カメムシ、イナゴなど主要害虫に速効的で強力な効果。さらに大豆、えだまめ、小豆、とうもろこし、かんしょ、キャベツ、麦類、やまのいもの害虫に登録されています。

サンケイ  
**トレボン®** 粉剤DL

人畜毒性：普通物 魚毒性：B類相当

■適用害虫および使用方法

平成19年7月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	使用量 (kg/10a)	使用時期	本剤およびエトフェンブロックスを含む農薬の総使用回数	使用方法
稲	イネツトムシ	4	収穫7日前まで	3回以内	散布
	カメムシ類	3~4			
	イネミズゾウムシ成虫				
	ツマグロヨコバイ				
	ウンカ類				
	コブノメイガ				
	アザミウマ類				
	イナゴ類				
	イネドロオイムシ				
	ニカメイチュウ				
イネヒメハモグリバエ	3				
フタオビコヤガ					
※休耕田	カメムシ類	3~4	—		
小麦	ヒメトビウンカ	4	収穫14日前まで	2回以内	散布
	アブラムシ類				
豆類 (種実)	ハスモンヨトウ	4	収穫21日前まで	3回以内	散布
	マメシンクイガ				
	シロイチモジマダラメイガ				
	カメムシ類				
	フタスジヒメハムシ				
ダイズサヤタマバエ					
えだまめ	カメムシ類	4	収穫14日前まで	4回以内	散布
	フタスジヒメハムシ				
	ダイズサヤタマバエ				
	アブラムシ類				
れんこん	マメコガネ				
やまのいも	シロイチモジヨトウ				
かんしょ	ハスモンヨトウ		収穫7日前まで		
	ナカジロシタバ				
とうもろこし	アワノメイガ				
キャベツ	ハスモンヨトウ	3~4	収穫3日前まで	3回以内	散布
	アブラムシ類				
	アオムシ				

※休耕田：ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田

特長

- ① 水稻のウンカ・ヨコバイ類に優れた効果
- ② 優れた速効性と残効性
- ③ 抵抗性害虫にも有効
- ④ 幅広い作物の害虫にも有効

⚠ 使用上の注意

- ① 水棲動物に影響を及ぼすので養魚田での使用は避けて下さい。また、養魚池周辺での使用も避けて下さい。
- ② 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤にくらべ、見かけ比重がやや大きく、流動性がよいので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布してください。
- ③ イネミズゾウムシ成虫に使用する場合、移動範囲が広いのでなるべく広域でいっせいに防除し、畦畔等の周辺雑草にも散布してください。
- ④ 眼に入った場合は直ちに水洗してください。
- ⑤ 使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。とくに適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、農業改良普及センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠ 蚕毒に関する注意

- 蚕に対して長期間毒性があるので、絶対に桑葉にかからないようにしてください。
- 汚染した桑葉は絶対に給桑しないでください。
- 散布作業後に桑園や蚕室などで養蚕作業することは絶対に避けてください。

- ラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届くところに置かないでください。