



自然を見つめる殺虫剤

トレボン® 乳剤

有効成分:エトフェンプロックス...20.0%

その他のPRTR該当成分:キシレン [PRTR・1種63]、エチルベンゼン [PRTR・1種40] ...78.0%

トレボン乳剤は たくさんの作物と 害虫に使えます。



トマト

オンシツコナジラミ
タバココナジラミ

スイカ

アブラムシ類
シルバーリーフコナジラミ
ハスモンヨトウ
ヨトウムシ



キュウリ

オンシツコナジラミ
アブラムシ類



ピーマン



アブラムシ類



テンサイ

ヨトウムシ

キャベツ



ハクサイ



アオムシ、
コナガ、
ヨトウムシ、
アブラムシ類

ダイコン



稲

コブノメイガ、
ツマグロヨコバイ
ウンカ類、
イネドロオウムシ、
イナゴ類
カメムシ類
イネミズノウムシ

フキ



タバココナジラミ
フキノメイガ
ヨトウムシ

サヤエンドウ

シロイチモジヨトウ
ウラナミシジミ
ヨトウムシ



メロン

アブラムシ類、
タバココナジラミ



カンキツ



コアオハナムグリ
ケンキスイ類
ミカンハモグリガ
チャノキイロアザミウマ

サヤインゲン

ワタアブラムシ
ウラナミシジミ
マメノメイガ



ショウガ



ハスモンヨトウ

ナス



オンシツコナジラミ
アブラムシ類

エダマメ

マメシンクイガ
シロイチモジマダラメイガ
ダイズサヤタマバエ
カメムシ類
フタスジヒメハムシ
ハスモンヨトウ



シロイチモジヨトウ

ネギ



ヒラスハナ
アザミウマ

リンドウ



サトイモ

トウモロコシ



アワノメイガ
アワトウ

ポインセチア

タバコ
コナジラミ



キク

アブラムシ類



ユリ

カンショ

ナカジロシタバ
アブラムシ類
ハスモンヨトウ



豆類

マメシンクイガ、アブラムシ類
シロイチモジマダラメイガ
カメムシ類、フキノメイガ
ダイズサヤタマバエ
フタスジヒメハムシ
ハスモンヨトウ
ウラナミシジミ



ニガウリ

アブラムシ類、ウリノメイガ
カメムシ類、コナジラミ類
ヨトウムシ類



ヤマノイモ

アブラムシ類
ヤマノイモコガ
ハスモンヨトウ



宿根カスミンソウ

シロイチモジヨトウ
ヨトウムシ



コムギ

ヒメトビウンカ
アブラムシ類



休耕田

カメムシ類



タバコ

タバコガ
ヨトウムシ
アブラムシ類

トルコキキョウ

ハスモンヨトウ



つつじ

ツツジゲンバイ



チャドクガ
マイマイガ
マツカレハ
エダシヤク類
オビカレハ
アメリカシロヒトリ

樹木類




茶

チャノソナガ、
チャノミドリヒメヨコバイ
チャノキイロアザミウマ

栽培する作物、
発生する害虫に
合わせてご使用
ください。

適用作物40種類
適用害虫52種類





自然を見つめる殺虫剤

トレボン® 乳剤

人畜毒性:普通物
魚毒性:B類相当

●適用害虫名と使用方法

【特長】

- ① 水稻のウンカ・ヨコバイ類に安定した効果
- ② 幅広い作物の主要害虫に優れた効果
- ③ 優れた速効性と残効性
- ④ 抵抗性害虫にも有効
- ⑤ 作物を守る特異な忌避作用

⚠ 使用上の注意

- ① 水産動物に対して通常の使用方法では影響は少ないが、一時に広範囲に使用する場合には十分注意してください。
- ② 本剤は水棲動物に影響を及ぼすので養魚田での使用はさけてください。また養殖池周辺での使用もさけてください。
- ③ ミツバチに対する影響は強いので、使用にあたっては巣箱を近くに置かないでください。また、散布液が蜜源植物にかからないよう十分注意してください。
- ④ 原液が眼に入った場合は直ちに水洗し、医師の手当を受けてください。散布液が眼に入った場合は直ちに水洗してください。
- ⑤ 本剤の使用に当たっては、病害虫防除等関係機関の指導を受けて、安全に使用してください。

⚠ 蚕毒に関する注意

- 蚕に対して長期間毒性があるので、絶対に桑葉にかからないようにしてください。
- 汚染された桑の葉は絶対に給桑しないでください。
- 本剤の散布作業後に桑園や蚕室などで養蚕作業をすることは絶対にさけてください。

- ラベルをよく読むこと。
- ラベルの記載以外には使用しないこと。
- 小児の手の届く所に置かないこと。

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	適用時期	本剤及びエトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	使用方法
稲	コブノメイガ	1000	収穫21日前まで	3回以内	散布
	ツマグロヨコバイ、ウンカ類 イネドロオイムシ、イナゴ類	1000~2000			
	カメムシ類 イネミスゾウムシ	2000			
	ウンカ類	300~600倍、25ℓ/10a			
	ツマグロヨコバイ イネミスゾウムシ イネドロオイムシ	300倍 25ℓ/10a			
※休耕田	カメムシ類	600倍、25ℓ/10a	—		
キャベツ	アオムシ、コナガ	2000	—		
はくさい	ヨトウムシ	1000~2000	収穫3日前まで		
だいこん	アブラムシ類		収穫7日前まで		
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000	収穫21日前まで	2回以内	
レタス	アブラムシ類		収穫14日前まで		
すいか	シルバーリーフコナジラミ	1000	収穫3日前まで	3回以内	
	ハスモンヨトウ ヨトウムシ				
メロン	タバココナジラミ アブラムシ類	1000~2000	収穫前日まで	3回以内	
なす	オンシツコナジラミ				
ピーマン	アブラムシ類	1000~2000	収穫前日まで	3回以内	
オクラ	カメムシ類				
きゅうり	オンシツコナジラミ アブラムシ類	1000	収穫3日前まで	2回以内	
	アブラムシ類 ウリノメイガ カメムシ類 コナジラミ類 ヨトウムシ類				
にがうり	アブラムシ類 ウリノメイガ カメムシ類 コナジラミ類 ヨトウムシ類	1000	収穫前日まで	2回以内	
トマト	オンシツコナジラミ タバココナジラミ				
さやえんどう	シロイチモジヨトウ ウラミシジミ ヨトウムシ	1000~2000	収穫7日前まで	2回以内	
さやいんげん	ワタアブラムシ ウラナミシジミ マメノメイガ				
えだまめ	マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ	1000~2000	収穫21日前まで	3回以内	
	ハスモンヨトウ				
かんきつ	コアオハナモグリ ケシキスイ類	1000	収穫14日前まで	2回以内	
	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ	1000~2000			
小麦	ヒメトビウンカ アブラムシ類	2000	収穫7日前まで	4回以内	
とうもろこし	アウノメイガ アウヨトウ	1000	収穫14日前まで	3回以内	
ふき	タバココナジラミ フキノメイガ ヨトウムシ		収穫7日前まで		
しょうが	ハスモンヨトウ	1000	収穫14日前まで	3回以内	
ばれいしょ	アブラムシ類				
さといも	ハスモンヨトウ	1000	収穫7日前まで	2回以内	
やまのいも	アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ				
かんしょ	ナガジロシタバ アブラムシ類 ハスモンヨトウ	1000	収穫14日前まで	2回以内	
	マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 ダイズサヤタマバエ フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ フキノメイガ				
豆類(種実)	マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 ダイズサヤタマバエ フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ フキノメイガ	1000~2000	収穫7日前まで	3回以内	
てんさい	ヨトウムシ				
茶	チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ	2000	摘採21日前まで	2回以内	
	タバコガ、ヨトウムシ				
たばこ	アブラムシ類	1000~2000	—		
つつじ	ツツジグンバイ	2000	—		
樹木類 (木本植物)	アメリカシロヒトリ チャドクガ、マイマイガ マツカレハ、エダシヤク類	4000	幼虫発生期	6回以内	
	オビカレハ	2000			
ポインセチア	タバココナジラミ	4000	—		
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ ヨトウムシ	2000	発生初期	—	
りんどう	ヒラスハナアザミウマ				
きく	アブラムシ類	2000	—		
カーネーション					
ゆり	アブラムシ類	1000	—		
トルコギキョウ	ハスモンヨトウ				

※休耕田：ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田

トレボン普及会

事務局:三井化学株式会社 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル TEL 03-3592-4452