

殺菌剤

イミノクタジン酢酸塩・銅水和剤

農林水産省登録 第16104号

ベブドー®水和剤

性 状：淡緑色水和性粉末45μm以下

毒 性：普通物

有効年限：4年

有効成分：イミノクタジン酢酸塩…………… 2.5%
塩基性塩化銅…………… 73.5%
(銅として44.0%)

包 装：500g袋×20、1kg袋×20

特 長

ベブドー®は、サンケイ化学株の登録商標です。

- 広い抗菌スペクトラムをもつ新しいタイプの殺菌剤イミノクタジン酢酸塩と保護効果の高い塩基性塩化銅の混合剤で広範囲の病害に高い予防効果があります。
- イミノクタジン酢酸塩と塩基性塩化銅の相乗効果で優れた防除効果があります。(うどんこ病、灰色かび病、炭疽病、新梢枯死症)
- 各種の薬剤耐性菌にも効果が高く、イミノクタジン酢酸塩および塩基性塩化銅はいずれも複雑な作用性をもつために本剤に対する耐性菌が出現する可能性は低いと考えられます。
- 植物体に過度に付着しないような製剤上の工夫がなされていますので、一般の無機銅水和剤に比較して、葉や果実の汚れが少なく、通常の散布では果実の汚染はほとんど問題ありません。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数
茶	炭疽病、赤焼病 も ち 病 網 も ち 病	500～700倍	摘採14日 前まで	2回以内	散 布	2回以内	-
	新梢枯死症 (輪斑病菌による) 褐色円星病 灰色かび病 黒葉腐病	500倍					
きゅうり	灰色かび病 炭疽病、べと病 斑点細菌病 うどんこ病 黒星病、褐斑病	1000倍	収穫前日 まで	3回以内		5回以内	
	菌核病	500倍					
かぼちゃ	うどんこ病 白斑病、疫病	500倍	収穫7日前 まで	4回以内		4回以内	
キャベツ	黒腐病、べと病		収穫14日 前まで	3回以内		3回以内	

使用上の注意事項

- 本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
- 石灰硫黄合剤、マシン油乳剤などの混用はさけてください。
- きゅうりに使用する場合には次の事項に注意してください。
 - 薬害を生じやすいので幼苗期散布はさけて中期以降に散布してください。
 - 尚、高温時の散布は症状が激しくなることがあるのでさけてください。
 - 連続散布は葉の周辺が黄化したり、硬化することがあるので過度の連用はさけてください。
- キャベツに使用する場合には次の事項に注意してください。
 - 結球開始期以降の散布で薬害を生じることがあるので注意してください。
 - 炭酸カルシウム剤の所定量の添加は、薬害軽減に有効です。

安全使用上の注意事項

- 取扱いは十分注意してください。
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。

本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。

- 粉末は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。また、散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

水産動植物に係る注意事項

- 本剤は水産動物に影響を及ぼしますが、通常的使用方法では問題ありません。