

殺菌剤

ストレプトマイシン・有機銅水和剤

農林水産省登録 第11297号

性 状：黄褐色水和性粉末45 μ m以下

ドーマイシン[®]水和剤

毒 性：普通物

有効成分：8-ヒドロキシキノリン銅(PRTR-1種325) … 40.0%
ストレプトマイシン硫酸塩 …… 6.3%
(ストレプトマイシンとして5.0%)

有効年限：3年

包 装：500g袋×20

特 長

ドーマイシン[®]は、サンケイ化学㈱の登録商標です。

- 保護殺菌作用の強い有機銅と細菌病にすぐれた効果を示すストレプトマイシンを主剤とし、それぞれの長を生かした製剤で、残効性もあり安定した防除効果を示します。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
こんにゃく	腐敗病 葉枯病	500	収穫30日前まで	6回以内	散布	6回以内 (種いもへの処理は1回以内)	8回以内
はくさい	軟腐病	600~1000		3回以内		3回以内	5回以内
レタス	軟腐病 腐敗病	1000	収穫21日前まで	2回以内		2回以内	
キャベツ	黒腐病		収穫14日前まで				3回以内
シクラメン	軟腐病	500	—	4回以内		8回以内	5回以内

使用上の注意事項

- 散布の際はマスク、手袋などをして散布液を吸い込んだり、多量に浴びたりしないように注意し、作業後は顔、手足など皮膚の露出部を石鹸でよく洗い、うがいをしてください。
- アルカリ性農薬と混用する場合は散布直前に混ぜてください。
- 散布の際は、葉裏にもよくかかるように散布してください。
- シクラメンの軟腐病に使用する場合、茎葉だけでなく、球根部に対しても十分かかるように散布してください。
- 本剤の使用により、薬害としてクロロシス（黄化現象）を生じることがあります。特に、高温多湿時及び幼苗期には薬害を生じやすいので留意の上、散布してください。
- はくさいに使用する場合、高温期及び幼苗期の散布をさけてください。
- レタス及びキャベツに使用する場合、高温期の連続散布はさけてください。

水産動植物に係る注意事項

- 本剤は水産動物に強い影響を及ぼすので、河川、湖沼、海域及び養殖池に本剤が飛散・流入する恐れのある場所では使用しないでください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。
散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。
また、空容器、空袋等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。