

# 殺菌剤

硫黄・銅水和剤

サンケイ  
園芸ボルドー



有効成分：塩基性塩化銅（銅として35.0%）… 61.0%  
硫黄…………… 25.0%

農林水産省登録 第4407号

性 状：淡緑色水和性粉末

毒 性：普通物

有効年限：4年

包 装：500g袋×20

## 特 長

○本剤は無機銅と硫黄を主剤とした製剤で、無機銅は広範囲の病害に対し予防散布することで高い保護作用があります。また、無機硫黄はうどんこ病などに強い殺菌効果を示します。

## 適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	本剤の 使用回数	使用方法	硫黄を 含む農薬の 総使用回数	銅を 含む農薬の 総使用回数
うり類	べと病 炭疽病 うどんこ病	400～800	-	散布	-	-
トマト ミニトマト	疫病					
豆類(種 実) 豆類(未成熟)	さび病					
ばれいしょ	疫病 夏疫病					
かんきつ	そうか病 かいよう病 黒点病					
なし	黒斑病					
ぶどう	褐斑病 晩腐病					

## 使用上の注意事項

- 高温時のうり類に対する使用は、葉害のおそれがあるので避けてください。
- 広範囲の殺虫剤、殺菌剤と混用できますが、強アルカリ薬剤との混用は避けてください。
- かんきつに使用する際は、葉害軽減のため炭酸カルシウム水和剤を加用してください。
- 本剤は蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

## 安全使用上の注意事項

- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の処置を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の処置を受けてください。
- 粉末は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の処置を受けてください。
- 散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

## 水産動植物に関する注意事項

- 通常の使用方法では影響は少ないですが、一時に広範囲に使用する場合には十分注意してください。