

殺虫・殺菌剤

水と硫黄剤

サンケイ
クムラス®

有効成分：硫黄…………… 79.2%



農林水産省登録 第21874号

性 状：褐色水と性微粒及び細粒

毒 性：普通物

危 険 物：第2類

有効年限：5年

包 装：1kg袋×20、3kg袋×8

特 長

○顆粒状製剤のため、薬液調製時の舞い上がりがありません。

クムラス®は、BASF社の登録商標です。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む 農薬の 総使用回数
果 樹 類	ハ ダ ニ 類	300~400倍	-	-	散布	-
いちご	うどんこ病	500~1000倍				
野菜類 (種実)	ハ ダ ニ 類	400倍				
いも類						
りんご	うどんこ病	350~450倍				
かんきつ	ミカンサビダニ	300~400倍				
か き	うどんこ病					
う め	黒 星 病	400倍				
も も						
麦 類	さび病	300~500倍				
	うどんこ病					
	赤かび病					
ば ら	うどんこ病					
き く	白さび病					
ホ ッ プ	べ と 病	250~500倍				
芝	さび病	300~500倍	発生初期		1㎡当り1ℓ散布	

使用上の注意事項

- 散布液調製の際には展着剤を加用し、調製後は速やかに使用してください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- マシン油乳剤との混用及びマシン油乳剤散布後14日以内の近接散布はさけてください。
- 気温が高くなるに従って薬害を生じやすくなるので、高温ほど散布液の濃度を所定の範囲内でうすくして使用してください。なお、夏期高温時（28℃以上）の散布はさけてください。
- 日本なし、ぶどう、うり類（きゅうり、まくわうり等）など硫黄剤に弱い作物への使用はさけてください。
- 本剤は蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

安全使用上の注意事項

- 通常の使用方法では危険性は低いが、誤飲、誤食などないように注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、医師の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。

付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。

- 散布の際はマスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり、浴びたりしないように注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

技術情報

●クムラスの混用薬害事例集（殺虫剤）

薬剤名	トマト	かぼちゃ	メロン	すいか	おおば
アーデント水和剤			○	○	
アグロスリン乳剤		○			○
アタフロン乳剤			○		
アディオン乳剤			○	○	○
アドマイヤーフロアブル					○
アドマイヤー顆粒水和剤	○				
アドマイヤー水和剤				○	
アプロードエースフロアブル	○				
アフーム乳剤	○		○	○	○
アフームエクセラ顆粒水和剤	○				
エスマルクDF	○				
オサダンフロアブル				○	
カスケード乳剤				×	
カネマイトフロアブル		○	○	○	
コテツフロアブル		×		○	
コロマイト乳剤	○		○	○	○
コロマイト水和剤				○	
サブリナフロアブル	○				○
サンクリスタル乳剤	○				○
サンマイトフロアブル	○	○		○	
ジェイエース水溶剤	○				
スタークル顆粒水溶剤	○	○			
スピノエース顆粒水和剤	○		○		○
スミロディー乳剤		○			
ゼンターリ顆粒水和剤					○
ダニサラバフロアブル			○		
ダニトロンフロアブル					○
ダントツ水溶剤		○			
チェス水和剤	○		○		
トルネードフロアブル	○				
トレボン乳剤	○		○		
トリガード液剤	○				
ニツラン水和剤					○
ハチハチ乳剤	○				
バリアード顆粒水和剤	○			○	
ピラニカEW				○	
フェニックス 顆粒水和剤	○				
ブリファード水和剤	○				
プレオフロアブル	○				○
フローバックDF	○				
マイトコーネフロアブル				○	
マイコータル	○				
マッチ乳剤	○				
モスピラン水溶剤			○	○	○
ラービフロアブル					○

※表中の丸印は薬害が出ないことを保証するものではありません。

2009年10月11日現在

●クムラスの混用薬害事例集（殺菌剤）

薬剤名	トマト	かぼちゃ	メロン	すいか	おおぼ
アミスター20フロアブル				○	○
アリエッティ水和剤		○			
インプレッション水和剤	○			○	○
オーソサイド水和剤80				○	
カリグリーン	○				
カンタスドライフロアブル	○		○		
コサイドボルドー	○				
サンクリスタル乳剤				○	
ジーファイン水和剤	○				
ジマンダイセン水和剤			○	○	
ストロビーフロアブル				○	○
スミブレンド水和剤	○				
スミレックス水和剤		○			
ダコニール1000	○		○	○	○
トップジンM水和剤		○	○	○	
トリフミン水和剤		○			
パンチョTF顆粒水和剤				○	
ビスダイセン水和剤			○	○	
フォリオプラボ顆粒水和剤				○	
ベルコート水和剤			○		
ベルコートフロアブル	○			○	
ベンコゼブフロアブル	○				
ボトピカ水和剤	○				
ホライズンドライフロアブル	○		○		
ポリベリン水和剤				○	
モレスタン水和剤				○	
ランマンフロアブル			○	○	
リドミルM Z水和剤			○	○	
ロブラール水和剤		○	○		

※表中の丸印は薬害が出ないことを保証するものではありません。

2009年10月11日現在