

展着剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル系展着剤 農林水産省登録 第14262号

プラテン80

有効成分：ポリオキシエチレン
ドデシルエーテル…………… 80.0%
(ポリ (オキシエチレン) =アルキルエーテル (PRTR・1種407) 43.2%)

性 状：白色透明液体

毒 性：普通物

有効年限：5年

包 装：500ml瓶×20

特 長

- 界面活性剤を主剤とした製剤で薬液の物理性を改良することにより、主剤の効果を十分に引きだします。
- 浸透性を高めるので薬液が速やかに植物表面に広がり、枝葉の重なりや外皮、死亡組織等の間隙に浸透します。

適用および使用方法

適用農薬名	作物名	散布液10ℓ当りの使用量 (希釈倍数)	使用方法
MEP剤	ぶどう (休眠期)	10～15ml (667～1000倍)	添 加
TPN剤	茶 (摘採直後)	12.5ml (800倍)	
殺菌剤・殺虫剤	稲、キャベツ、ねぎ類、さといも等の薬液のつきにくい作物	2～3ml (3000～5000倍)	
	果樹、野菜等の薬液のつきやすい作物	1～2ml (5000～10000倍)	

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤を添加する適用農薬の使用法、使用上の注意事項を厳守してください。
- 本剤は、ぶどうのブドウトラカミキリの冬期防除に際し、MEP剤に添加して使用してください。
- 生育期に低濃度で使用する場合、薬害を生じやすい薬剤に本剤を添加すると、薬害を助長する恐れがあるので使用をさけてください。

安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないように注意してください。
- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないように注意してください。
眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
また散布液を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

水産動植物に係る注意事項

- 通常の使用方法では影響は少ないです。