

# 殺虫剤

エトフェンプロックス粉剤

農林水産省登録 第16756号

**サンケイ**  
**トレボン®粉剤DL**

性 状：類白色粉末45μm以下 浮遊性指数20以下

毒 性：普通物

有効年限：4年

有効成分：エトフェンプロックス …………… 0.5%

包 装：3kg袋×8

## 特 長

トレボン®は、三井化学アグロ㈱の登録商標です。

- ピレスロイド様化合物エトフェンプロックスを含む水稲用殺虫剤です。  
速効性とともに残効性に優れ、長期間害虫の発生を抑えます。
- 有機りん剤やカーバメート剤抵抗性害虫にも有効です。

## 適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール 当り使用 量 (kg)	使用時期	本 剤 の 使用回数	使用方法	エトフェンプロックス を含む農薬の 総使用回数	
稲	イネツトムシ	4	収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
	カメムシ類、ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ成虫 ウンカ類、イネドロオイムシ コブノメイガ、ニカメイチュウ アザミウマ類、イナゴ類	3~4					
	イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ	3					
※休耕田	カメムシ類	3~4	-				
小 麦	ヒメトビウンカ アブラムシ類	4	収穫14日前まで	2回以内	散 布	2回以内	
豆 類 (種実)	ハスモンヨトウ、カメムシ類 マメシクイガ、フキノメイガ シロイチモジマダラメイガ フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ アブラムシ類						
えだまめ	ハスモンヨトウ	3~4	収穫21日前まで				
	マメシクイガ、カメムシ類 シロイチモジマダラメイガ フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ	4					
れんこん	マメコガネ		4	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
やまのいも	シロイチモジヨトウ						
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ	収穫7日前まで		4回以内			4回以内
とうもろこし	アワノメイガ						
キャベツ	ハスモンヨトウ、アオムシ アブラムシ類	3~4	収穫3日前まで	3回以内		3回以内	

※休耕田：ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田

## 使用上の注意事項

- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布してください。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにしてください。
- 散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別してください。
- イネミズゾウムシ成虫に使用する場合、移動範囲が広いのでなるべく広域でいっせいに防除し、畦畔などの周辺雑草にも散布してください。

- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめで使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。なお、農業改良普及センター、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

#### **安全使用上の注意事項**

- 誤食などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。  
眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は手足、顔等を石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。

#### **水産動植物に係る注意事項**

- 本剤は水産動物に影響を及ぼすので養魚田での使用は避けてください。
- 本剤が水槽、池、河川などに入らないように注意してください。
- 甲殻類及び冷水魚に特に影響を及ぼす恐れがあるので、養殖池等周辺での使用はさけてください。