

殺虫剤

エトフェンプロックス水和剤

登録番号：第17176号

サンケイ
トレボン[®]水和剤

性 状：類白色水和性粉末63 μ m以下
毒 性：普通物、魚毒性：B類（原体）

有効成分：エトフェンプロックス …………… 20.0%

有効年限：4年

包 装：500g袋×20

特 長

- 果樹の主要害虫に優れた効果を示します。
- 速効性とともに残効性に優れるため、長期間害虫の発生を抑えます。
- かきのカメムシ類に対して、飛来防止や摂食阻害など、特異な忌避作用があり、作物を害虫による被害から守ります。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農業の総使用回数					
稲	イネミズゾウムシ	100倍	移植前日～移植当日	3回以内	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5ℓ）1箱当り希釈液500mlを散布	3回以内					
	ツマグロヨコバイ ウンカ類、カメムシ類	2000倍	収穫21日前まで								
りんご	モモシンクイガ キンモンホソガ	1000～2000倍	収穫14日前まで		散 布						
	ハマキムシ類	2000倍									
なし	シンクイムシ類 ナシチビガ、アブラムシ類	1000～2000倍						収穫30日前まで			
	ハマキムシ類	2000倍									
もも	モモハモグリガ シンクイムシ類	1000倍									
	ハマキムシ類	2000倍									
くり	クリシギゾウムシ	1000倍									
	カキノハタムシガ チャミノガ	1000～2000倍									
かき	ハマキムシ類、カメムシ類 チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ	1000倍									

注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 水産動物に影響を及ぼすので養魚田での使用はさけてください。散布液が水槽、池、河川などに入らないように注意してください。甲殻類及び冷水魚に特に影響を及ぼす恐れがあるので、養殖池等の周辺での使用はさけてください。なお、比較的低濃度でも魚が平衡失調を起こす恐れがあるので十分注意してください。 **魚介類注意**
- 蚕に対して長期間毒性がありますので、近くに桑園がある場合には桑葉にかからないようにしてください。散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別してください。 **カイコ注意**
- 散布に際してはミツバチ、マメコバチ及び巣箱に絶対にかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。