

サンケイ化学 農薬登録情報

ベルコートフロアブル

登録変更のお知らせ

弊社取り扱い品目「ベルコートフロアブル」が10月4日付けで、下記のように登録内容が変更されました。

商品名:ベルコートフロアブル

有効成分:イミクタジアルベシル酸塩・・・30.0%

登録番号:農林水産省登録 第19884号 (日本曹達㈱登録)

登録内容変更月日:2006年10月4日

登録要項変更内容

作物名「うめ」の適用病害虫名「黒星病」「灰色かび病」及び「すす斑病」を追加。

作物名「いちご」の適用病害虫名「炭疽病」及び「うどんこ病」を追加。

作物名「りんご」の使用時期を「収穫3日前まで」に変更。

作物名「りんご」の適用病害虫名「褐斑病」「すす点病」及び「すす斑病」の希釈倍数に「1500倍」を加え、「1000～1500倍」に変更。

作物名「なし」の適用病害虫名「うどんこ病」を追加。

作物名「みかん」及び「かんきつ(みかんを除く)」の適用病害虫名「そうか病」を追加。

作物名「すいか」の適用病害虫名「つる枯れ病」を追加。

作物名「だいず」の適用病害虫名「腐敗病」を追加。

作物名「茶」の適用病害虫名「輪斑病」を追加。

作物名「なし」のイミクタジンを含む農薬の総使用回数を「5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内)」に変更。

登録内容変更後の適用病害虫の範囲および使用方法(今回の変更分だけを記載)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミノカジンを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病	1000～1500倍	200～700 リットル/10a	収穫3日前まで	5回以内 (但し、開花期以降散布は3回以内)	散布	7回以内(液剤及び水和剤は合計5回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内)
	黒星病						
	輪紋病						
	褐斑病	1000～1500倍					
	すす点病						
すす斑病							
なし	黒斑病	1500倍	200～700 リットル/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内)
	黒星病						
	輪紋病						
	うどんこ病	1500倍		収穫14日前まで	4回以内		
うめ	黒星病	2000倍	200～700 リットル/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	灰色かび病						
	すす斑病						
みかん	そうか病	1000倍	200～700 リットル/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内
かんきつ(みかんを除く)							
すいか	つる枯病	1000倍	150～300 リットル/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
いちご	炭疽病	1000倍	200～300 リットル/10a	育苗期(定植前)	5回以内	散布	7回以内(育苗期は5回以内、本圃では2回以内)
	うどんこ病	2000～4000倍		収穫前日まで(生育期)	2回以内		
だいず	腐敗病	1000倍	150～300 リットル/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内(種子粉衣は1回以内)
茶	輪斑病	1500～2000倍	200～400 リットル/10a	摘採21日前まで	2回以内	散布	2回以内

サンケイ化学㈱営業企画部
TEL:099-268-7588