

サンケイ化学 農薬登録情報

ダントツ粒剤

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い品目「ダントツ粒剤」が11月15日付けで、下記のように適用拡大登録されました。

商品名:ダントツ粒剤

有効成分:クチアニジン・・・0.5%

登録番号:農林水産省登録 第20800号 (住化武田農薬(株)登録)

販売エリア:鹿児島県・宮崎県・熊本県

適用拡大登録月日:2006年11月15日

拡大登録取得内容

作物名「キャベツ」の適用病害虫名「モモアブラムシ」を「アブラムシ類」を変更。

作物名「キャベツ」の適用病害虫名「アブラムシ類」に使用時期「は種時」及び「定植時」を追加。

作物名「キャベツ」の適用病害虫名「コナガ」及び「アオムシ」に使用時期「定植時」を追加。

作物名「キャベツ」に適用病害虫名「ネキリムシ類」及び「ハイマダラノメイガ」を追加。

作物名「メロン」「なす」及び「ピーマン」の適用病害虫名「アブラムシ類」に使用時期「育苗期後半」を追加。

作物名「トマト」及び「ミニトマト」の適用病害虫名「アブラムシ類」に使用時期「育苗期後半」を追加。

作物名「きゅうり」の適用病害虫名「コナジラミ類」に使用時期「育苗期後半」を追加。

作物名「カーネーション」の適用病害虫名「アブラムシ類」を追加。

作物名「メロン」及び「なす」のクチアニジンを含む農薬の総使用回数の表記を「4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)」から「4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)」に変更。

作物名「キャベツ」のクチアニジンを含む農薬の総使用回数の表記を「3回以内(育苗期の株元処理は1回以内、散布は2回以内)」から「3回以内(は種時の散布、育苗期の土壌混和は土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)」に変更。

作物名「ピーマン」のクチアニジンを含む農薬の総使用回数の表記を「3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)」から「3回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)」に変更。

変更後の適用病害虫の範囲および使用方法(今回の登録拡大分のみ記載)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用回数(1)	使用回数(2)	使用方法
きゅうり	コナジラミ類	1g/株	育苗期後半	1回	4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)	株元処理
メロン	アブラムシ類	1g/株	育苗期後半	1回	4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)	株元処理
	コナジラミ類	1g/株	定植時			植穴処理 土壌混和
	アブラムシ類	1~2g/株				
	ミナキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2g/株				
なす	アブラムシ類	1g/株	育苗期後半	1回	4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)	株元処理
	アブラムシ類	1g/株	定植時			植穴処理 土壌混和
	マメハモグリバエ					
	コナジラミ類					
トマト	アブラムシ類	1g/株	鉢上時	1回	4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)	株元処理
ミニトマト	アブラムシ類	1g/株	鉢上時	1回	4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)	株元処理
キャベツ	アブラムシ類	0.25g/株	は種時	1回	4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)	覆土後セル 成型育苗トレイの上から散布する。
	ハイマダラノメイガ	0.25g/株	は種時			
	ネキリムシ類	0.5g/株	育苗期後半			株元処理
	コナガ	0.5g/株	育苗期後半			株元処理
	アオムシ	0.5g/株				
	アブラムシ類	0.5g/株	定植時			植穴処理 土壌混和
	アブラムシ類	1g/株				
	コナガ アオムシ	2g/株				
ピーマン	アブラムシ類	1g/株	育苗期後半	1回	3回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	株元処理
	アブラムシ類	1g/株	定植時			植穴処理 土壌混和
カーネーション	アブラムシ類	1g/株	発生初期	4回以内	4回以内	生育期株元処理

使用回数(1):本剤の使用回数

使用回数(2):ジネフランを含む農薬の総使用回数

サンケイ化学㈱営業企画部

TEL:099-268-7588