

# サンケイ化学 農薬登録情報

## キルパー

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱品目「キルパー」が7月31日付けで、下記のように適用拡大登録されました。

商品名 :キルパー

有効成分 カナマナトリウム塩・・・30.0%

登録番号 :農林水産省登録 第18525号

(バックマンラボラトリーズ(株)登録)

適用拡大登録月日 :2006年7月31日

### 拡大登録取得内容

作物名「ほうれんそう」の使用時期を「は種又は定植の10～24日前まで」に変更。

作物名「きゅうり」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、適用病害虫「つる割病」畑地1年生雑草」及び「ネコセンチュウ」の使用量を「原液として40～60 $\mu$ l/10」に変更。

作物名「すいか」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、適用病害虫「畑地1年生雑草」及び「ネコセンチュウ」の使用量を「原液4ml/1穴」を「原液として40 $\mu$ l/10a」に変更。

作物名「かぼちゃ」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更。

作物名「クソ」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、使用量を「原液として40リットル/10a」に変更。

作物名「ビーマン」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、使用量を「原液として40リットル/10a」に変更。

作物名「とうがらし類」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、使用量を「原液として40リットル/10a」に変更。

作物名「かんしょ」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、使用量を「原液として40リットル/10a」に変更。

作物名「にんじん」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、使用量を「原液として40～60リットル/10a」に変更。

作物名「トマト」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、使用量を「原液として40～60リットル/10a」に変更。

作物名「ミニトマト」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、使用量を「原液として40～60リットル/10a」に変更。

作物名「なす」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、使用量を「原液として40リットル/10a」に変更。

作物名「こんにゃく」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、使用量を「原液として40リットル/10a」に変更。

作物名「ごぼう」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、使用量を「原液として40リットル/10a」に変更。

作物名「さといも」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、使用量を「原液として40リットル/10a」に変更。

作物名「ねぎ」、作物名「わけぎ」及び「あさつき」の適用雑草名「畑地一年生雑草」に使用方法「予め被覆した内で、所定量の薬液を水で希釈し、土壌表面に散布または灌水する。」を追加する。

作物名「ねぎ」、作物名「わけぎ」及び「あさつき」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、さらにそれぞれの

適用病害虫「白絹病」及び「畑地一年生雑草」の使用量「原液4m<sup>2</sup>1穴、40L/10a」を「原液として40リットル/10a」に変更。

作物名「だいこん」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、使用量を「原液として40～60リットル/10a」とする。

作物名「いちご」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、使用量を「原液として60リットル/10a」とする。

作物名「かぶ」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、さらに使用量を「原液として40リットル/10a」に変更。

作物名「みょうが」を「みょうが(花穂)」と「みょうが(茎葉)」に分け、作物名「みょうが(花穂)」及び「みょうが(茎葉)」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更する。作物名「しょうが」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、さらに使用方法「所定量の薬液を土壌中15cmの深さに注入し直ちに覆土・鎮圧する」の使用量を「原液として60リットル/10a」に変更。

作物名「さやえんどう」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更。

作物名「実えんどう」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更。

作物名「キャベツ」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、さらに適用病害虫「根こぶ病」及び「畑地一年生雑草」の使用量を「原液として40～60リットル/10a」に変更。

作物名「はくさい」の使用時期を「は種又は定植の10～24日前まで」に変更。

作物名「たまねぎ」の使用時期を「は種又は定植の10～24日前まで」に変更。

作物名「タス」の適用雑草名「畑地一年生雑草」に使用方法「予め被覆した内で、所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。」を追加する。

作物名「タス」に適用病害虫名「すそ枯病」を追加する。作物名「タス」の使用時期を「は種又は定植の10～24日前まで」に変更。

作物名「非結球レタス」の適用病害虫及び雑草名「根腐病」、「ビッグベイン病」、「すそ枯病」及び「畑地一年生雑草」を追加する。

作物名「にら」の適用病害虫及び雑草名「畑地一年生雑草」に使用方法「所定量の薬液を土壌表面に散布し直ちに混和し被覆する」を追加する。

作物名「きく」の使用時期を「は種又は定植の15～24日前まで」に変更し、さらに使用方法「所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに覆土・鎮圧する」も使用量を「原液として40リットル/10a」に変更。

作物名「トルコキョウ」の適用病害虫及び雑草名「立枯病」及び「畑地一年生雑草」を追加する。

作物名「ゆり」の適用病害虫及び雑草名「乾腐病」及び「畑地一年生雑草」を追加する。

作物名「しゃくやく(薬用)」の適用病害虫名「根黒斑病」を追加する。

作物名「たばこ」の適用病害虫名「立枯病」を追加する。

作物名「たばこ」の適用病害虫名「ネコセンチュウ」の使用量を「原液として40リットル/10a」に変更。

変更後の登録内容(新規登録だけ記載)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用回数	使用回数	使用方法
ねぎ	畑地一年生雑草	原液として60リットル/10a	は種又は定植の10～24日前まで	1回	1回	予め被覆した内で、所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。
わけぎ	畑地一年生雑草	原液として60リットル/10a	は種又は定植の10～24日前まで	1回	1回	予め被覆した内で、所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。
あさつき	畑地一年生雑草	原液として60リットル/10a	は種又は定植の10～24日前まで	1回	1回	予め被覆した内で、所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。
レタス	畑地一年生雑草	原液として40～60リットル/10a	は種又は定植の10～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆
レタス	すそ枯病	原液として60リットル/10a	は種又は定植の10～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。
非結球レタス	根腐病	原液として40～60リットル/10a	は種又は定植の10～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆
非結球レタス	畑地一年生雑草	原液として40～60リットル/10a	は種又は定植の10～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆
非結球レタス	ビッグベイン病	原液として60リットル/10a	は種又は定植の10～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。
非結球レタス	すそ枯病	原液として60リットル/10a	は種又は定植の10～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。
非結球レタス	畑地一年生雑草	原液として60リットル/10a	は種又は定植の10～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。
にら	畑地一年生雑草	原液として60リットル/10a	は種又は定植の10～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。

変更後の登録内容 (新規登録だけ記載)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用回数	使用回数	使用方法
トレコギキョウ	立枯病	原液として60リットル/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆する。
トレコギキョウ	畑地一年生雑草	原液として60リットル/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆する。
トレコギキョウ	立枯病	原液として60リットル/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	1回	予め被覆した内で、所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。
トレコギキョウ	畑地一年生雑草	原液として60リットル/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	1回	予め被覆した内で、所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。
トレコギキョウ	立枯病	原液として60リットル/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。
トレコギキョウ	畑地一年生雑草	原液として60リットル/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。
ゆり	乾腐病	原液として60リットル/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。
ゆり	畑地一年生雑草	原液として60リットル/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。
ゆり	乾腐病	原液として60リットル/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	1回	予め被覆した内で、所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。
ゆり	畑地一年生雑草	原液として60リットル/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	1回	予め被覆した内で、所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または灌水する。
ゆり	乾腐病	原液として60リットル/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆する。
ゆり	畑地一年生雑草	原液として60リットル/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆する。
しゃくやく(薬用)	根黒斑病	原液として60リットル/10a	は種又は定植の15～24日前まで	1回	1回	所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆する。
たばこ	立枯病	原液として60リットル/10a	秋期 (翌春植付け)	1回	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し鎮圧する。