

サンケイ化学 農薬登録情報

マイシン 20水和剤

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録品目「マイシン20水和剤」が11月15日付けで、下記のように適用拡大登録されました。

商品名:マイシン20水和剤

有効成分:ストロブマイシン・・・20.0%

登録番号:農林水産省登録 第8088号

(サンケイ化学㈱登録)

適用拡大登録月日:2006年11月15日

登録拡大・登録削除項目内容

作物名「かんきつ」を削除。

「もも」の使用時期を「収穫60日前まで」に変更し、総使用回数を「2回以内」とする。

「すもも」の使用時期を「収穫30日前まで」に変更し、総使用回数を「2回以内」とする。

「うめ」の使用時期を「収穫90日前まで」に変更し、総使用回数を「2回以内」とする。

「はくさい」の使用時期を「収穫14日前まで」に変更し、総使用回数を「3回以内」とする。

変更後の適用病害虫の範囲および使用方法						
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	使用回数(1)	使用回数(2)	使用方法
りんご	枝枯細菌病	2000倍	収穫60日前まで	3回以内	3回以内	散布
なし			収穫75日前まで			
もも	せん孔細菌病	1000～2000倍	収穫60日前まで	2回以内	2回以内	
すもも	黒斑病・かいよう病	1000倍	収穫30日前まで			
うめ	かいよう病	1000～2000倍	収穫90日前まで			
キウイフルーツ	かいよう病 花腐細菌病	1000倍	収穫90日前まで	4回以内	4回以内(樹幹注入は1回以内)	
さるなし	花腐細菌病	1000倍	開花前	2回以内	2回以内	
キャベツ	黒腐病	2000倍	収穫14日前まで			

変更後の適用病害虫の範囲および使用方法						
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	使用回数(1)	使用回数(2)	使用方法
はくさい	軟腐病	1000～2000倍	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	散布
レタス	腐敗病	2000倍	収穫14日前まで	2回以内	2回以内	
こんにゃく		1000～2000倍	収穫30日前まで	6回以内	6回以内(種芋への処理は1回以内)	
たまねぎ	軟腐病	1000倍	収穫7日前まで	5回以内	5回以内	
ばれいしょ	疫病	1000～1500倍	収穫7日前まで		5回以内	
	軟腐病	1000倍				
	そうか病	60～100倍	植付前	1回	5～10秒間種いも浸漬	
黒あし病						
たばこ	立枯病	1000倍	収穫3日前まで	2回以内	2回以内	散布または株元灌注

使用回数(1): 本剤の使用回数

使用回数(2): ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数

サンケイ化学㈱ 営業企画部
TEL: 099-(268)-7588